



**Mi Universidad**

# *SUPER NOTA*

**NOMBRE DEL ALUMNO: KARLA FERNANDA DÍAZ MAZARIEGOS  
NOMBRE DEL TEMA: PATOLOGIAS EN BOVINOS.**

**PARCIAL:4**

**NOMBRE DE LA MATERIA: PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS  
DE BOVINOS.**

**NOMBRE DEL PROFESOR: MVZ RAUL DE JESUS CRUZ  
LOPEZ**

**NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA  
Y ZOOTECNIA**

**CUATRIMESTRE: 5**

**COMITÁN 30-03-25**


# HERNIA UMBILICAL



La hernia umbilical en bovinos puede ser causada por factores congénitos, adquiridos o de manejo

## FACTORES ADQUIRIDOS

- Infecciones umbilicales
- Debilidad o lisis de los músculos abdominales
- Succión del ombligo entre becerros
- Distensión de la pared abdominal
- Lesiones externas
- Úlceras abomasales



## Factores congénitos


La abertura en los músculos abdominales no se cierra por completo.

## Factores de manejo

- Tracción excesiva de un feto demasiado grande
- Sección del cordón umbilical demasiado cerca de la pared abdominal

## SINTOMAS .

Abultamiento en la zona correspondiente a la cicatriz umbilical, Secreción purulenta, Calor y dolor asociados.



## TRATAMIENTO .

- La técnica de elección para hernias de gran tamaño es la cirugía
- Se recomienda la apertura del saco herniario con posterior herniorrafia
- Se disecan o extirpan los tejidos fibrosos o cicatriciales que se han formado alrededor de la hernia y se cierra el defecto con suturas

