



Nombre de alumno: Luis Ángel López Méndez.

Nombre del profesor: Raúl de Jesús Cruz López.

Nombre del trabajo: Súper Nota.

Materia: Patologías y técnicas quirúrgicas en Bovinos.

Grado: 5°

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 30 de marzo del 2025

FASES DE UNA DESVIACION DE PENE

1

Preoperatorio

Los bovinos seleccionados se le tomaron medida tomando como referencia el pliegue de la babilla $<45^\circ$ del lado izquierdo. la piel del área operatoria se lavó con jabón quirúrgico, una depilación. Para la sedación se aplicó Xilazina al 2% y sujetando al px de cubito lateral derecho. Con un bloqueo de la zona con lidocaína al 2%

2

Transoperatorio

El cirujano inicia el corte a 2 o 3 cm del meatro prepucial utilizando una hoja de bisturi del num. 22 y posteriormente tijeras de punta roma para desbridar el forro, haciendo una disección de este, con el fin de aumentar su movilidad, con una longitud de 2 a 3 cm, posteriormente se procedió a desbridar el plano subcutáneo con tijeras de punta roma, en dirección oblicua, esto es el ángulo aproximado de desviación 45°

3

realizar el tunel subcutáneo en ángulo de desviación de 45°

Al exterior el rodete cutáneo del prepucio, en el corte circular, se procedió a fijarlo mediante puntos separados con material de sutura, no absorbible, dejando un dren. Para estas dos suturas se empleo agujas semicurvas de ojo automático con punta triangular del numero 4

4

Postoperatorio

Incluye penicilina G, procaina con curaciones durante 7 días, retirando los puntos al 12 día