

UDS

Nombre de alumno: IVÁN DE JESÚS MORENO LÓPEZ

NOMBRE DEL PROFESOR: RAUL DE JESUS CRUZ LOPEZ

Nombre del trabajo: SUPER NOTA

Materia: PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE BOVINOS

Grado: 5

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de ENERO de 2025.

Coccidios en bovinos

Control

Se sugiere:

Realizar tareas de limpieza y desinfección en las instalaciones de producción

Características

Evitar instalaciones sucias con presencia de lodo, encharcamientos y heces

Ejemplos

Asegurar comederos limpios y libres de heces. Impedir la contaminación del agua potable con heces Para no propagar más la enfermedad en los bovinos de carne

Prevención

Se recomienda:

Tratamientos a través de la dieta formulada en bovinos de engorda

Ejemplos

administrar Cocciliber® de manera continua en el alimento a una dosis de 11 a 33 ppm (partes por millón) de monensina (de 27.5 a 82.5 g de Cocciliber® por tonelada de alimento)

Tratamiento

Se recomienda:

Administrar fármacos a Terneros como prevención a la coccidiosis causada por Eimeriabovis e Eimeria zuernii en bovinos de engorda

Ejemplos

fármacos que contienen agentes anticoccidiales como triazinas o ionóforos. Como alternativa, las sulfonamidas como Gorban® (reg. Q-0273-137) también se utilizan ampliamente para el tratamiento de la coccidiosis.