

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**MVZ: ADRIÁN BALBUENA ESPINOSA**

**ALUMNO: ALEJANDRO DANIEL ALVAREZ  
VAZQUEZ**

**MATERIA: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA**

**TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

**OCTAVO CUATRIMESTRE**

**MARZO 8, 2025**



Las gatas pueden entrar en celo en cualquier época del año, siempre y cuando las condiciones climáticas sean óptimas. Es menos común que suceda en invierno, por ejemplo. Algunas de las señales de que la hembra está en celo:

- Está más cariñosa de lo normal
- Se revuelca en el suelo, cama o sofá
- Se frota contra objetos y personas (u otras mascotas)
- Maúlla intensa y repetitivamente
- Orina con olor más fuerte





## **CICLO REPRODUCTIVO DE LA GATA**

El celo de una gata dura solo algunos días, pero está muy bien diferenciado en cuatro fases, cada una con características propias:

### **PROESTRO**

En esta etapa la hembra se prepara físicamente para copular: se inflama la vagina, 'coquetea' o se insinúa y maúlla de forma leve. El proestro dura aproximadamente tres días y se conoce como etapa de cortejo.

### **ESTRO**

Este es el periodo de la receptividad sexual, en el que la hembra puede recibir al macho para copular. El estro dura entre cuatro y seis días, pero si la gata no se aparea puede extenderse hasta los 15 días. El maullido intenso, consecutivo y fuerte es lo más característico de esta etapa.

### **METAESTRO**

Es esta fase muy corta –solo 24 horas– que a veces pasa desapercibida dentro del ciclo reproductivo de los gatos. La gata no permite el acercamiento de un macho, se vuelve muy agresiva y, en caso de estar preñada, puede protagonizar cambios en sus hábitos: dormirá y comerá más.





## **ANESTRO**

Es la última etapa del celo en las gatas, la cual es diferente según si quedó preñada o no. En el último caso, todo 'volverá a la normalidad' hasta dos o tres meses más tarde, cuando el ciclo se reanude.

