



Mi Universidad

Ensayo

Nombre del Alumno: Noremy Abigail Trujillo Sánchez

Nombre del tema: El síndrome del cólico

Parcial: 3ro

Nombre de la Materia: introducción a la patología y técnicas quirúrgicas de Equinos

Nombre del profesor: Guillermo Montesinos Moguel

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootenia

Cuatrimestre: 5to

SINDROME EL COLICO.

(Indica dolor abdominal)

Causa: Distensión gaseosa, Impacción, brida intestinal, Cambios bruscos en la alimentación.

El síndrome es causado por problemas digestivos más comunes, su evolución es rápida y pone en peligro la vida del animal.
Se dice que existe varios tipos de colicos.

• **Timpanico:** Por grandes cantidades de gas que no consiguen avanzar el tubo digestivo y salir del mismo

• **Impacción:** Producido con los alimentos que no son ingeridos correctamente a través del intestino.

• **Espasmodicos:** (intermitente), puede que este presente durante 20-30 min y desaparece, volviendo a aparecer después

• **Torsión del intestino:** Quedan atropados en otra zona intestinal.

> Diagnóstico Clínico

- Tiempo de inicio
- Detección
- Cambios en la alimentación
- Síntomas observados

> Signos Clínicos

- Dolor abdominal intenso
- Postura de aturdo
- Sudoración
- Palidez
- Náuseas
- Vomitos
- Distensión abdominal
- Ansiedad o inquietud.

- Examen físico

- FC (28-44) normal.
- FR (10-24 res/min)
- T° (Búsqueda de fiebre)
- Mucosa y llenado capilar

- Palpación rectal

- Sonda nasogastrica

- Ecografía.

> Tratamiento directamente Clínico.

- Analgesia
- Flunixinil: 1.1 mg/kg cada 24 hrs
via i.v / i.m
(10 ml / 450 kg).

- Relajantes Musculares

• Metgumina:

• Metocarbamol

- Hidratación y manejo nutricional

- Caminar al caballo

- Aceite mineral.

*Colicos por urgencia A

¿Signos de shock?

- > Cardiovasculares
 - Mucosa pálida, cianótica.
 - Tiempo de llenado capilar (>2-3 sg)
 - FC elevada (<66-81 pm)
 - Pulso débil
 - Extremidades frías
- > Signos respiratorios
 - Taquipnea
 - Disnea en casos graves
- > Metabólicos y neurológicos
 - Depresión o letargo extremo
 - Sudoración profusa
 - Temblores musculares
 - Colapso (Avanzado)
- > Digestivos
 - Hipomotilidad o ausencia de ruidos asociados. (intestinales)
 - Distensión abdominal marcada
 - Dolor intenso

> Prevención General.

- Alimentación balanceada
- No hacer cambios bruscos a la dieta
- Ejercicio regularmente
- Desparasitante con un control adecuado
- Supervisar el consumo de objetos o arena que hay en los suelos del pabellón donde se encuentra el equino

¿Qué dolor no cede con anestesia?

- Torsión intestinal
- Estrangulaciones vasculares
- Ruptura Intestinal
- Impactación grave con isquemia

> Causas comunes.

- Torsión intestinal
- Hernias estranguladas
- Desplazamiento del ceco
- Intusepcción.

Conclusión.

Podemos decir que en este caso como tal dice, no es una enfermedad ya que no tiene un agente etiológico causante a esto

La mejor manera sería detectando los primeros síntomas, por que después puede llegar hacer para algo quirúrgico o matar.

Hoy en día muchos dueños no proceden a dar autoridad para algo quirúrgico y prefieren matar al animal o no darle su tratamiento adecuado, así que la mejor opción es preventivo.

Tratamiento ✓

(Los primeros signos)

Preventivo ✓