



Nombre de alumno: Daniela Itzel Rendon López

Nombre del profesor: Guillermo Montesinos Moguel

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

Materia: Patologías y técnicas quirúrgicas en especies pequeñas

Grado: 5º

Grupo: Medicina veterinaria y zootecnia.

PARASITOS PRINCIPALES

Anquilostomas

- Afecta intestino delgado y pulmones
- Vómitos, pérdida de peso, diarrea,, debilidad y síntomas respiratorios
- Los perros y gatos pueden contraer anquilostomas del medio ambiente, como suelos o en heces de animales infectados

Trematodos

- Afecta hígado y pulmones
- Tos crónica con esputo sanguinolento, dolor torácico, disnea y fiebre
- Los perros se infectan de trematodos al comer presas, como el cangrejo de río, que contienen el parásito enquistado

Ascariasis

- Afecta el intestino delgado
- Pelaje áspero, sin brillo, pérdida de peso, diarreas, vómitos, abdomen hinchado
- Los perros se infectan de ascariasis al ingerir alimentos, vómitos, heces o aguas contaminadas con el parásito

Tenias

- Afecta el intestino delgado
- Vómitos, pérdida de peso, picazón alrededor del ano, dolor abdominal, emaciación
- Los perros se infectan al ingerir pulgas infectadas, estas pulgas llevan las larvas, si las ingiere tu perro se transforman en tenias

Nematodos

- Afecta al SNC, intestino y sistema respiratorio
- Distensión abdominal, retraso de crecimiento, debilidad, diarrea, pérdida de pelo
- Los gatos suelen infectarse al lamers el pelo o las patas contaminadas o mediante el consumo de roedores

Coccidios

- Afecta el intestino delgado y la vista del animal (ciegos)
- Diarrea sanguinolenta, anorexia, deshidratación, dolor abdominal, pérdida de peso
- Los gatos se infectan al ingerir alimentos o agua contaminada, al lamer superficies contaminadas

Toxicariasis

- Afecta el intestino delgado
- Anemia, pérdida de peso, diarrea con sangre, letargo y neumonitis
- Los gatos se infectan mediante la ingestión de huevos infectantes presentes en el medio ambiente o carne cruda

Giardias

- Afecta el intestino delgado
- Vómitos, heces blandas oscuras, pérdida de peso, diarrea acuosa
- Los gatos se infectan al ingerir quistes de este parásito, los cuales se encuentran en las heces o tierra contaminada