



**Nombre de alumno: Rocio Paola Molina  
Mendoza**

**Nombre del profesor: Guillermo  
Montesinos Moguel**

**Nombre del trabajo: Principales parásitos  
y sus características morfológicas**

**Materia: Patología y técnicas quirúrgicas  
de pequeñas especies**

**Grado: 5°**

**Parcial: 3**

**Grupo: "A" Medicina Veterinaria Y  
Zootecnia**

**Ocosingo Chiapas, 7 de marzo del 2025**

# Principales parásitos

Endoparásito (nemátodos-gusanos redondos)

Es causada por toxocariasis

Presentan diarrea, vómitos, abdomen distendido, retraso en el crecimiento y letargo

Se da por la ingestión de huevos en el suelo contaminado, leche o por depredación de animales infectados

Endoparásito (*Ancylostoma caninum*)

Afección causada por anquilostomiasis

Presenta anemia severa, debilidad, diarrea sanguinolenta, pérdida de peso

Penetran las larvas a través de la piel o ingestión de larvas en alimentos o leche

★ Endoparasito (*Trichuris vulpis/trichuris campanula*)

Afección causada por Tricuriasis

Presentan diarrea crónica con moco y sangre, deshidratación, pérdida de peso

Se da la transmisión por la ingestión de huevos en el suelo contaminado

★ Cestodos -gusanos planos o tenias, (*dipylidium caninum*)

Es causada por Dipilidiasis

Presentan prurito anal, eliminación de segmentos del parásito en las heces, vómitos, adelgazamiento

La transmisión se da por la ingestión de pulgas infectadas con larvas del parásito

Cestodos (*echinococcus granulosus*)

Afección causada por Equinococosis o Hildatidosis

En perros y gatos es asintomático los signos clínicos

Se transmite por la ingestión de carne cruda, vísceras infectadas, contacto con heces contaminadas

Protozoarios (*giardia spp*)

Afección causada por giardiasis

Presentan diarrea crónica con mal olor, pérdida de peso, letargo

Se transmite a través de agua y alimentos contaminados con quistes del parásito

Protozoarios (*Cystoisospora spp*)

Es causada por coccidiosis

Presentan diarrea acuosa, deshidratación, pérdida de peso, letargo en cachorros y gatitos

Se transmite por ingestión de ooquistes en ambientes contaminados

Protozoarios (*toxoplasma gondii*)

Causada por toxoplasmosis

En gatos son asintomáticos y en perros presentan fiebre, síntomas neurológicos, inflamación de los ganglios linfáticos

La transmisión es por carne cruda o contacto con heces contaminadas

Ectoparásitos-parásitos externos, (pulgas)

Es causada por dermatitis alérgica por pulgas, anemia, infestaciones severas

Se presentan prurito intenso, lesiones en la piel, caída del pelo, costras

Se transmite por contacto con animales infestados o ambientes contaminados

Garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus-garrapata marrón del perro*)

Es causada por Eriquiosis babesiosis

Presentan fiebre, letargo, hemorragias, cojeras

Se transmite por picaduras de garrapatas infectadas

Ácaros (*sarcoptes scabiei*)

Causada por Sarna sarcóptica

Presentan picazón intensa, piel engrosada, pérdida de pelo, lesiones costras

Se transmite por contacto directo con animales infectados

Ácaros (*otodectes cynotis*)

Causada por Otitis parasitaria

Presentan sacudidas de cabeza, rascado de orejas, mal olor, acumulación de cerumen oscuro

Se transmite por contacto directo con animales infestados