



**Nombre de alumno: Jesus Esquivel  
Jimenez Saragos**

**Nombre del profesor: Mvz Guillermo  
Montesinos Moguel**

**Nombre del trabajo: Manejo de la Hembra  
Posparto**

**Materia: Ginecología y Obstetricia**

**Grado: 8°**

**Grupo: Medicina Veterinaria y Zootecnia**

Ocosingo, Chiapas 30 de Marzo del 2025



# CUIDADOS POSPARTO EN ANIMALES DE PRODUCCIÓN BOVINOS

El manejo de una vaca posparto incluye proporcionarle cuidados, controlar su salud y alimentación, y revisar su reproducción.

## Manejo de la madre y el ternero después del parto

- Si no ha habido complicaciones, la vaca suele ser capaz de atender al ternero, lo lame para eliminar los restos del parto y lo estimula para ponerse en pie y mamar. Sin embargo, es preciso atender a los dos para comprobar que su estado de salud es bueno.
- **En el caso de la vaca, es necesario:**
- Comprobar si ha sufrido desgarros o algún traumatismo en el canal del parto. Si tiene alguna lesión, deberá ser tratada por el veterinario.
- Mantenerla en un ambiente limpio y revisar que la ubre está limpia y libre de mastitis.
- Vigilar la expulsión de la placenta y los loquios para evitar el desarrollo de metritis.
- Controlar la aparición de enfermedades metabólicas y del periparto, especialmente la hipocalcemia y la cetosis.





## **El ternero necesita atención inmediata, en su caso aplicando estas medidas:**

- Comprobar que respira sin dificultad y que no tiene obstrucciones en las vías aéreas. Si hubiera alguna situación que comprometa su salud o su supervivencia, hay que avisar al veterinario de inmediato.
- Limpiarlo y secarlo rápidamente para evitar la hipotermia, frotando vigorosamente con paja limpia, que lo estimula a ponerse en pie.
- Desinfectar el ombligo con una solución yodada, evitando así las infecciones.
- Administrando una toma completa de calostro lo antes posible para prevenir enfermedades infecciosas como la diarrea neonatal o la neumonía.

## **Cuidados**

- Ofrecerle agua tibia para que se hidrate y aumente el volumen del rumen
- Controlar que expulse la placenta en el plazo establecido
- Revisar que no tenga infecciones uterinas
- Verificar que el ternero respire y mame
- Desinfectar el ombligo del ternero con yodo



# CUIDADOS POSPARTO EN YEGUAS

Mantener a la yegua gestante en el lugar del parto durante 3-4 semanas antes de la fecha esperada del parto aumentará la inmunidad de la yegua frente a los patógenos presentes en el ambiente

La calidad del calostro se mejorará administrando vacunas de refuerzo 4-6 semanas antes de la fecha prevista de parto de la yegua

- El manejo de una yegua posparto incluye su alimentación, la atención al potro y la observación de que el útero se involucre

## Alimentación

- Proporcionar grandes cantidades de heno de buena calidad
- Proporcionar pienso en cantidades cercanas al límite superior del rango recomendado
- Dividir las raciones en varias tomas al día



### Atención al potro

- Asegurarse de que el potro respira bien y que sus vías respiratorias no están ocluidas
- Dejar que el cordón umbilical se desgarre por sí solo
- Desinfectar el ombligo con clorhexidina 4% unas cuatro o seis veces al día las primeras 48 horas

### Observación del útero

- Las yeguas continúan con pequeñas contracciones del útero después del parto, que se denominan “dolores de entuerto”
- Si el proceso de involución uterina no se produce después de las 12 horas y habiendo sido eliminada la placenta, se puede sospechar de la existencia de un cuadro de cólico o de otra patología





# CUIDADOS POSPARTO EN OVINOS

- El manejo de una oveja posparto implica proporcionarle agua, alimento, y cuidados para que ella y su cría estén saludables.
- Debemos preocuparnos por el estado nutricional de la oveja antes de su fecha probable de parto, el cual comienza a deteriorarse marcadamente en los últimos 40 días de gestación debido al crecimiento acelerado del feto
- Es práctico entregar concentrados para ovinos preparto o lactantes ya que en general estos traen una cantidad de minerales y vitaminas que permite cubrir los requerimientos
- Es importante en la última etapa de gestación realizar la vacunación de la oveja contra bacterias del género Clostridium

## Cuidados post parto

- Disponibilidad de agua y el consumo de grano es crucial tanto para que no empeore el estado nutricional de la oveja y para que el cordero reciba una cantidad abundante de leche



- Debemos recordar que hasta los 30 días de vida la leche es el único alimento, solo después de los 30 días el cordero comenzará a comer forraje, dependiendo exclusivamente de este entre los 45 y 60 días.

### Cuidados del recién nacido

- Más del 50% de mortalidad en los corderos se produce en los tres primeros días de vida, por lo tanto, debemos asegurarnos de que tomen calostro
- Secar a los corderos; desinfectar el ombligo
- Acercar al cordero para tomar calostro
- Mantenerlos en un lugar bajo techo mínimo 48 horas y enterrar las placentas para impedir la llegada de perros
- Observar que la oveja estimule a la cría y que la alimente adecuadamente
- Asegurar que el cordero levante la cabeza y que la oveja lo acicale
- Desinfectar el ombligo del cordero recién nacido





# CUIDADOS POSPARTO EN CABRAS

## Cuidado de la madre

- Cortar los pelos que rodean el área genital para evitar infecciones
- Pesar a la hembra 24 horas después del parto
- Pesar a la hembra cada 5 días, después del parto y hasta el destete

## Cuidado de los Neonatos

- Asegurar que los cabritos ingieran calostro de buena calidad
- Desinfectar el cordón umbilical con tintura de yodo y aplicar curabichera alrededor
- Extraer los brotes de los cuernos de la cría
- Proporcionar un lugar cálido y seco para evitar hipotermia
- Mantener a los cabritos en corrales limpios, soleados y con reparo
- Prestar atención a la aparición de diarreas, presencia de parásitos externos

## ATENCIÓN AL NEONATO

- Se debe de limpiar la flema de la nariz y verificar si respira bien la madre lama o limpie a la cría para estimularle la circulación y comenzar a reconocerse por ambas partes.
- Esperar unos 5 minutos para ver si se rompe por sí solo y en caso de que no se debe de cortar a 4 cm del cuerpo y se debe de poner yodo en el mismo.





# CUIDADOS POSPARTO EN CERDAS

## Higiene

- Se debe recoger el estiércol detrás de las cerdas una o dos veces al día.
- Se debe lavar las tetillas y el vientre con jabón suave y agua tibia antes de colocarla en la paridera.
- Se debe desinfectar la sala de maternidad con 15 días de anticipación.

## Preparación de la sala de partos

- Se debe trasladar a las cerdas a un alojamiento seco y cálido alrededor de 3 días antes de la fecha probable de parto .
- Se lo debe haber vaciado, limpiado, desinfectado y lo más importante, secado.
- Si el suelo de la jaula es enrejillado y es muy probable que el parto se produzca de noche, cuelgue una lámpara en la parte posterior de la jaula.
- Asegúrese que no hay corrientes o flujos de aire a través del alojamiento.
- Verifique que los chupetes para el agua funcionen.



## Alimentación

- Las cerdas lactantes tienen altas necesidades nutricionales.
- Se debe proporcionar una dieta fibrosa o laxante desde el día 11<sup>o</sup> hasta la primera semana posparto.
- Se debe continuar con el perfil de las materias primas entre la gestación y la lactación.

## Cuidados del recién nacido

- Hay que asegurarse que cada lechón respire al nacer. Se lo puede estimular secándolo con una toalla o trapo, priorizando las fosas nasales y boca, que vienen cubiertas con mucosa y membrana placentaria.
- Una vez que haya tomado suficiente calostro y ha terminado de mamar, se coloca otra vez dentro del nido durante 1 hora.
- Durante el parto, cuando el lechón no está mamando es colocado en el nido durante 1 hora.
- En todo momento, si un lechón se encuentra recostado al lado de la cerda y no está mamando, se lo coloca devuelta en el nido por un rato.
- Realizar el corte del cordón umbilical y desinfección del ombligo.
- Se requiere una temperatura entre 32° C y 35° C en el ambiente.

## Otros cuidados

- Se debe controlar la temperatura rectal de la cerda.
- Se debe observar el comportamiento de la cerda.