Nombre de alumno: Jesus Esquivel Jimenez Saragos

Nombre del profesor: Mvz Guillermo Montesinos Moguel

Nombre del trabajo: Diagnóstico de Gestación

Materia: Ginecología y Obstetricia

Grado: 8°

Grupo: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Ocosingo, Chiapas 15 De Febrero del 2025

Diagnostico de Gestacion en Diferentes Especies

Los metodos de diagnostico de gestación en animales varian segun el tipo de animal y pueden incluir pruebas de sangre, orina, analisis de semen y ecografía y palpación.

¿Que es el diagnostico de gestacion?

Es unica oportunidad de la veterinaria tiene para revisar el estado de salud del animal y detectar cualquier enfermedad o problema.

Diagnostico de gestacion en bovinos

Diagnostico de gestacion en ovejas

Diagnostico gestacion con ecografia

La ecografía también es útil para determinar la salud del feto y la evaluación de la viabilidad fetal. Es más precisa a partir de los 30 días de gestación. Antes de los 21 días los embriones son demasiado pequeños para ser detectados por ecografía. Es una herramienta que ofrece gran versatilidad y rapidez que no es la suya.

Diagnostico gestacion con radiografia

Consiste en los puntos de osificación del feto, que aparecen a partir de los 45 días de gestación. Es una técnica que ofrece una certeza absoluta sobre la gestación y permite la determinación de la cantidad de feto que hay en el útero.

Diagnostico palpacion abdominal

En el animal vivo veterinaria, tomara y palpara el abdomen para detectar el feto, usualmente a partir de los 22 a 28 después del parto.

Test serologicos

Pueden ofrecer diagnósticos más rápidos y precisos que los métodos tradicionales, como la Revista de Zoogeo, para no ejercer presión sobre el animal del feto como medidas.

Son de embarazo varios, que sirde test de embarazo varios que sirde test de 23 de embarazo

Diagnostico de gestacion en cerdas y gatas

Rectal

Las mediante palpación comprimido

Palpacion transrectal

Se realiza a partir del día 35 de gestación y es una técnica sencilla y de bajo costo. Sin embargo, requiere cierta práctica para evitar dañar el intestino y el útero. Es una técnica que ofrece una certeza del 90% en la determinación de la cantidad de feto que hay en el útero.

Ultrasonido

El diagnóstico de gestación en hembras por ultrasonido es una herramienta rápida y no invasiva. Se puede realizar desde los días 25 a 30 de gestación.

Indirecto

Cabezas, ojos y la vesícula de detritusque la vesícula amniótica y el saco vitelino. Es una técnica que ofrece una certeza del 100% en la determinación de la cantidad de feto que hay en el útero.

Hormonal

Se realiza a partir del día 21 de gestación y es una técnica sencilla y de bajo costo. Sin embargo, requiere cierta práctica para evitar dañar el intestino y el útero. Es una técnica que ofrece una certeza del 90% en la determinación de la cantidad de feto que hay en el útero.

Progesterona

Es una hormona producida por el cuerpo lúteo durante la preñez. Su medición en la sangre o la orina puede ser un indicador positivo o para de No de la Dieta. Es una prueba rápida y económica. Tiene una fiabilidad que varía ofrecer certeza.

Gonadotropinas

Son gonadotropinas que los cultivos de los embriones y también detectan de la gestación. Es una prueba rápida y aproximadamente 15 días después de la ovulación. Es una prueba que ofrece certeza.

Otro

Se las vacas no pueden portadas, sean sobre todo en gestación, sobre todo a 21 días después del servicio.

Diagnostico de gestacion en yeguas

Diagnostico transrectal

El control de gestación debe ser revisada a partir del día 14 de gestación, con una frecuencia regular posteriormente 14 días cha la

Ultrasonido transrectal

Es una técnica sencilla y de bajo costo. Sin embargo, requiere cierta práctica para evitar dañar el intestino y el útero. Es una técnica que ofrece una certeza del 90% en la determinación de la cantidad de feto que hay en el útero.

Ultrasonido abdominal

Es una técnica sencilla y de bajo costo. Sin embargo, requiere cierta práctica para evitar dañar el intestino y el útero. Es una técnica que ofrece una certeza del 90% en la determinación de la cantidad de feto que hay en el útero.

Prueba sanguinea

La prueba más rápida y económica de diagnóstico de gestación en yeguas es la Prueba de Progesterona. Tiene una fiabilidad que varía dependiendo del momento

Hormona que son producidas mayor del cuerpo lúteo durante la preñez. Tiene una fiabilidad que varía dependiendo del momento

Gonadotropinas

Gonadotropinas que son producidas en el cuerpo lúteo durante la preñez. Tiene una fiabilidad que varía dependiendo del momento

Prueba urinaria

La prueba más rápida y económica de diagnóstico de gestación en yeguas es la Prueba de Estrógenos. Tiene una fiabilidad que varía dependiendo del momento

Ecografia

Es una técnica no invasiva que ofrece una certeza del 100% en la determinación de la cantidad de feto que hay en el útero.

Palpacion rectal

Es una técnica sencilla y de bajo costo. Sin embargo, requiere cierta práctica para evitar dañar el intestino y el útero. Es una técnica que ofrece una certeza del 90% en la determinación de la cantidad de feto que hay en el útero.

Palpacion abdominal

Es una técnica sencilla y de bajo costo. Sin embargo, requiere cierta práctica para evitar dañar el intestino y el útero. Es una técnica que ofrece una certeza del 90% en la determinación de la cantidad de feto que hay en el útero.

Diagnostico de gestacion en Perros

Ultrasonografia

La ultrasonografía es una técnica no invasiva que ofrece una certeza del 100% en la gestación, que se mantiene desde el momento concepción en adelante.

Palpacion vaginal

Una vez que el feto ha la concentración de hormonas en la sangre de la madre. Un veterinario tiene Estrógenos Gonadotropinas compatibles con fuerte. Es una técnica que ofrece una certeza del 90% en la determinación de la gestación.

Analisis de orina

Se trata de una técnica rápida y económica que ofrece una certeza del 90% en la determinación de la gestación, que se puede realizar a partir del día 21 de gestación.

Analisis de sangre

La hormona relaxina es una hormona que se puede detectar en la sangre de la madre a partir del día 21 de gestación. Es una técnica que ofrece una certeza del 90% en la determinación de la gestación.

Pruebas de fertilidad

Los equipos de ultrasonido ofrecen una imagen clara del feto y permiten la detección de latidos cardíacos desde el día 25 hasta el final. Esta técnica ofrece una certeza del 100% en la determinación de la gestación.

Los veterinarios también pueden realizar palpaciones rectales para detectar la presencia de fetos. Esta técnica ofrece una certeza del 90% en la determinación de la gestación, aunque puede ser invasiva y requiere gran experiencia.

Los veterinarios también realizan comprobaciones cruzadas con pruebas de fertilidad como la prueba de progesterona o la prueba de interpretación de los sonidos cardíacos fetales para confirmar el diagnóstico.

Diagnostico de gestacion en Ovinos y Caprinos

Ecografia

La ecografía transabdominal es una técnica no invasiva que ofrece una certeza del 100% en la gestación, a partir del día 30 de gestación.

Palpacion

La palpación transabdominal es una técnica sencilla y económica que ofrece una certeza del 90% en la gestación.

Palpacion rectal

La palpación rectal es una técnica más fiable a partir del día 45 de gestación.

Palpacion abdominal

La palpación abdominal es una técnica que ofrece una certeza del 90% en la gestación.

Palpacion vaginal

La palpación vaginal es una técnica que ofrece una certeza del 90% en la gestación.

Medicion de hormonas

Las concentraciones de progesterona en la sangre son un indicador de la gestación.

Analisis de orina

La medida de relaxina, un estrógeno específico del embarazo, en la orina ofrece una certeza del 100% en la determinación de la gestación.

Diagnostico de gestacion en Conejos

Palpacion

Puede ofrecer una certeza de un 75 % dirigiendo una mano sobre el abdomen a partir de los días 10 a 14 días, y a partir de los días 20 a 25 días, se puede ver el crecimiento del feto.

Ecografia

Es posible realizar un ultrasonido para determinar la viabilidad fetal.

Analisis de sangre

Es posible detectar cambios en el nivel de hormonas como la relaxina a partir de los 14 días.

Experimentos de inseminacion artificial Tha 120

Es la vía más directa de diagnóstico. Aplicar suero al suero gonadotropina y suero hormona.

Tema Zenzone

Presented with xmind