UDS
Mi Universidad

MATERIA:

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

NOMBRE DEL CATEDRÁTICO:

Guillermo Montesinos Moguel

NOMBRE DE LA ALUMNA:

Eduviges Jocabed Gómez Navarro

los métodos de diagnóstico de gestación y los tiempos adecuados en diferentes especies

Palpación abdominal

puede ayudar a identificar y localizar el dolor abdominal durante el examen físico

- Perros
  - entre 20-30 días después de la cópula
- Gatos
  - entre 15-25 días después de la cópula
- Cerdos
  - entre 20-30 días después de la cópula
- Ovejas y cabras
  - entre 30-45 días después de la cópula.

Ultrasonido

La ultrasonografía se puede utilizar para determinar la edad gestacional mediante la medición de estructuras fetales y extrafetales

- Perros
  - entre 20-30 días después de la cópula.
- Gatos
  - entre 15-25 días después de la cópula
- Caballos
  - entre 14-16 días después de la cópula.
- Vacas
  - entre 35-45 días después de la cópula
- cerdos
  - entre 20-30 días después de la cópula
- Ovejas y cabras
  - entre 30-45 días después de la cópula

Radiografía

la radiografía nos permite saber el tamaño de los fetos, y evaluar si podrán ser expulsados por el canal de parto

- Perros
  - entre 45-60 días después de la cópula
- Gatos
  - entre 30-45 días después de la cópula

Prueba de relaxina

es la única hormona conocida específica de la gestación en perras informando de la presencia de tejido placentario productor de ésta.

- Perros
  - entre 20-30 días después de la cópula.

Prueba de progesterona

Se trata de una hormona propia de las hembras de los animales, producida por el cuerpo lúteo de los mamíferos

- Perros
  - entre 20-30 días después de la cópula.
- Gatos
  - entre 15-25 días después de la cópula.
- Caballos
  - entre 14-16 días después de la cópula
- Vacas
  - entre 35-45 días después de la cópula
- cerdos
  - entre 20-30 días después de la cópula.
- Ovejas y cabras
  - entre 30-45 días después de la cópula.

Palpación rectal

introduciendo la mano a través del recto para identificar signos positivos de preñez que incluyen la asimetría en el útero, la presencia de cotiledones/carúnculas o la vesícula amniótica y el deslizamiento de la membrana fetal.

- Caballos
  - entre 14-16 días después de la cópula
- Vacas
  - entre 35-45 días después de la cópula.

Presented with xmind