



Alexander Higinio Pérez Monjaraz

Taenia (solium, saginta) y cisticercosis

4° Parcial

Microbiología y parasitología

Q.F.B Hugo Nájera Mijangos

Licenciatura en Medicina Humana

2° Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 28 de junio de 2025

TAENIA SAGINATA

ADULTO EN EL INTESTINO DELGADO DEL HOMBRE



HUEVO
HUEVO EMBRIONADO



PROGLÓTIDOS GRAVIDOS EN LAS HECES

LLEGAN AL SUELO Y SON INGERIDOS POR EL GANADO




EN EL INTESTINO, LOS HUEVO DEJAN SALIR LARVAS, QUE ATRAVIESAN LA PARED INTESTINAL Y LLEGAN A LOS VASOS SANGUINEOS

EL ESCOLEX SE FIJA A LA MUCOSA INTESTINAL Y DA ORIGEN AL GUSANO ADULTO



EL T.S LLEVA LAS ONCOSFERAS Y OTROS TEJIDO



EL HOMBRE INGIERE CISTICERCOS EN LA CARNE INSUFICIENTEMENTE COCIDA

EL T.J CONJUNTIVO INTRAMUSCULAR LAS ONCOSFERAS SE TRANSFORMAN EN CISTICERCOS

