# TRICHURIS TRICHIURA

ESTE NEMATODO SE INCLUYE EN EL GRUPO DE LOS **HELMITOS** TRANSMITIDO POR EL SUELO; EN SUS ETAPAS DE DESARROLLO DEBE PERMANECER **2 o 4** SEMANAS EN EL SUELO PARA LOGRAR SU MADURACIÓN.

## CARACTERISTICAS

- EXTREMO ANTERIOR DELGADO Y EL POSTERIOR MAS GRUESO. (APARIENCIA DE LATIGO)
- LA HEMBRA ES MAS GRANDE QUE EL MACHO.
- EL MACHO TIENE EL EXTREMO POSTERIOR ENRROSCADO Y UNA ESPÍCULA COPULATORIA.

- AMBOS TIENEN BOCA, ESOFAGO, INTESTINO Y ANO.
- EL MACHO MIDE ENTRE **30 y 45mm**,
- LA HEMBRA ENTRE **35 y 50mm**.
- LOS **HUEVOS** SON FORMA OVALADA PARECIDOS A UN BALÓN DE FÚTBOL AMERICANO, CON TAPONES **MUCOSOS EN AMBOS POLOS**, UNA CUBIERTA TRIPLE, Y MIDEN ENTRE **50-60 micras DE LARGO** POR **25-35 micras DE ANCHO.**





## EPIDEMIOLOGIA

1- OCUPA EL TERCER LUGAR EN FRECUENCIA DESPUES DE LA ASCARIASIS.
2- EN LA REPUBLICA MEXICANA ES LA SEGUNDA MAS FRECUENTE
3- AFECTA PRINCIPALMENTE A **NIÑOS** EN EDAD PRESCOLAR Y ESCOLAR.