

- H. S. Tipo 2.

- ★ Células de la mucosa genital
- ★ S.N.: Ganglios sacros.

Causa

- Cuadros severos como el tipo 1
- R. Nacidos infección en canal de parto

Diseminación

Ganglios Sacros → S.N.C.

Epidemiología

- Actividad Sexual.
- Contacto directo a lesiones.
- Contacto con secreciones genitales.

> Características virales

Subfamilia Alphavirinae

- ADN de doble hélice 152 kb
- Cápside icosaédrica de 62 capsómeros
- Capa amorfa que rodea a la cápside
- Envoltura

Patogénesis

- El virus entra en contacto con una mucosa o la piel.
- Aborda terminaciones nerviosas
- A través de las neuronas llega a los ganglios nerviosos y se establece
- Reactivación que produce infección recurrente
- Respuesta inmune. linfocitos T citotóxicos, linfocitos T CD8+, linfocitos T CD4+, IgM e IgG.

Manifestaciones clínicas

- Herpes orofaríngeo - Herpes ocular
- Herpes genital - Herpes congénito
- **Paradiso hepático.**

Diagnóstico

- Forma clínica
- Aislamiento viral: **Productos biológicos**
- Inoculación en cultivos celulares: **C. tejidos de Cel. VERO**
- Microscopia electrónica
- Diagnóstico serológico
- Id. de ADN viral.
- **C. de tejidos de fibroblastos de prepucio**

