




Mi Universidad

MEDICINA HUMANA

Christina Maily De León Rivera

Dr. Agenor Abarca Espinosa

Fisiología

Licenciatura en Medicina Humana

2do . Semestre

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 23 de enero de 2025

Insuficiencia Cardíaca

La insuficiencia Cardíaca se produce cuando el músculo cardíaco no bombea sangre de la manera que debena cuando esto sucede la sangre a menudo retrocede y el líquido se puede acumular en los pulmones lo que causa Falta de aliento.

Algunas afecciones Cardíacas progresivamente dejan el corazón demasiado debil o regulo como para llenarse y bombear sangre de forma apropiada estas afecciones incluyen arterias estrechas en el corazón y presión arterial alta con tratamiento adecuado puede mejorar los sintoma de la insuficiencia Cardíaca y puede ser mortal.

Síntomas

Cuando la insuficiencia Cardíaca el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo.

- Falta de aire durante una actividad o cuando están acostados
- Fatiga y debilidad
- Hinchazón en las piernas y en los tobillos y en los pies.

- ▶ Latidos del corazón rápidos o irregulares
- ▶ Menor capacidad para hacer ejercicio
- ▶ Hinchazón
- ▶ Tos que no desaparece o tos con mucosidad de color blanca o rosa y puntos de sangre
- ▶ Hinchazón del abdomen
- ▶ Aumento de peso muy rápido debido a la acumulación de líquidos.
- ▶ Náuseas y falta de apetito
- ▶ Dificultad para concentrarse o menor estado de alerta.
- ▶ Dolor en el pecho si la insuficiencia cardíaca es producto de un ataque cardíaco

La insuficiencia cardíaca casi siempre es una afección prolongada crónica pero se puede presentar repetidamente puede ser causada por muchos problemas diferentes del corazón.

puede ser por la afección que afecta únicamente el lado derecho o el lado izquierdo del corazón ambos lados del corazón.

Su miocardio no puede contraerse muy bien esto se denomina insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca sistólica o cardíaca con una fracción con eyección reducida (HFrEF) el miocardio está rígido y no se llena de sangre fácilmente aunque la potencia de bombeo es normal.

Esto se denomina insuficiencia cardíaca diastólica o cardíaca con una eyección preservada (HFpEF por sus siglas en inglés)

Sangre rica en oxígeno
Penetra en el
Corazón desde los
Pulmones y sale

Sangre pobre en
oxígeno
Penetra en el el cuerpo
y sale hacia los
pulmones.

A medida que el bombeo del corazón se vuelve menos eficaz, la sangre puede acumularse en otras zonas del cuerpo el líquido se acumula en los pulmones, el hígado, piernas esto se denomina insuficiencia cardíaca congestiva o de forma más sencilla.