

TRICHOMONAS

TRES ESPECIES

Trichomonas Tenax
Trichomonas vaginalis
Trichomonas Hominis

TRICHOMONA TENAX

Tronfozoito oval o periforme
5 a 15 μ m
5 flagelos, axostilo, Nucleo ovoide
y Citostoma

TRICHOMONA VAGINALIS

Forma alargada y ovoide 7 a 20 μ m
Posee una estructura Central
Nucleo elíptico
- Cromatina uniforme y envuelto
Con membrana nuclear
Esqueleto de tubulina y fibras
de actina
4 Flagelos Cortos, Penacho en R A
Flagelo en la membrana ondulante

EPIDEMIOLOGIA


- Mas Frecuentes en mujeres
- Personas sin Vida Sexual
Activa, En personas Virgenes
- Transmision Actividad Sexual
- Fomites

- Ropa Intima
- Toalla Femenina
- Agua

- Objetos con Fluidos
Genitales



CICLO BIOLÓGICO



GIARDIA LAMBLIA

TRES ESPECIES

- ☐ Gardiasis Muris
- ☐ Gardiasis Agilis
- ☐ Gardiasis Duodenalis

MORFOLOGIA

- ☐ Dos Formas (vegetativa y Quiste)
- ☐ Parasito en el tubo digestivo del hombre (vegetativa)

- ☐ Trofozoito (Etapa vegetativa)
 - Se alimenta, se reproduce y causa síntomas al huésped

Simetría bilateral, es periforme
 - Mide 12 a 15 micras 5 a 9 de diámetro y 12 espesor, de manera aplanada y Dirección dorso-ventral

- Apariencia o Apariencia
- Dos núcleos
- Cuerpos flagelares
- Ligamento central (cilios y flagelos)
- Borde y Surco lateral (límite de la membrana)
- Pódocitos (cilios y flagelos)
- Cilios de membranas y aparato de flagelos
- Flagelótopos
- Bifurcaciones



QUISTE

- Ovalado
- Diámetro 6 a 12 M
- Fase de resistencia
- Pared quística 0.3 a 0.5 m
- Contiene núcleos, restos de flagelos, cuerpos parabasales, vacuolas, 4 kinetoplastos
- Fragmentos del disco nuclear y cuerpo medio.

CICLO BIOLÓGICO

