

**CESAR FELIPE MORALES SOLIS**

**DR. RAUL DE LA ROSA PACHECO**

**NEUROLOGIA**

**PLATAFORMA**

**6**

PASIÓN POR EDUCAR

**A**

# CLASIFICACION DE CEFALEAS

	DEFINICION	CARACTERISTICAS	SINTOMAS	EPIDEMIOLOGIA	DURACION	INTENSIDAD	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO
<b>Racimos o Horner</b>	Se caracteriza por episodios de cefalea de intensidad extrema, los cuales son unilaterales y se presentan periorbital al ojo o bien en la región temporal.	<p>Presenta predominio nocturno.</p> <p>Se manifiestan episodios cíclicos, conocidos como "racimos", que pueden prolongarse durante semanas o meses.</p> <p>Posteriormente, ocurren períodos de remisión.</p> <p>Cada episodio se inicia y concluye de forma repentina.</p>	Lagrimeo Congestión nasal Edema periorbital púlsatil ptosis palpebral	+ Hombres	15 - 180 hrs	moderada - severa	Clinica	Sumatriptán de 6 mg
<b>Migraña</b>	<p>Con aura ——— trastornos neurológicos transitorios sensoriales, que preceden al dolor de cabeza.</p> <p>Sin aura ——— Aparición repentina de una cefalea hemicraneal, o en algunos casos menos frecuentes, de forma generalizada.</p> <p>No se presentan síntomas neurológicos previos.</p>	<p>Puede presentarse con aura o sin aura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con aura: Es la forma clásica y se observa en aproximadamente el 25% de los casos.</li> <li>- Sin aura: Es la presentación más común, presente en el 75% de los casos.</li> <li>- El dolor es de tipo pulsátil y hemicraneal.</li> <li>- Suele intensificarse con el movimiento de la cabeza.</li> </ul>	<p>Vomito</p> <p>nauseas</p> <p>fotofobia</p> <p>Fosfenos</p> <p>Sonofobia</p>	+ Mujeres (No tengo nada)	4 - 72 hrs	moderada - severa	5 Crisis en en 1 mes	<p>Hidratación</p> <p>Ibuprofeno 600 mg</p> <p>Paracetamol 1 gr</p> <p>En situacion aguda : Lidocaina spray en las fosas nasales</p> <p>Sublingual: Zolmitriptano de 2-5 mg</p> <p>Intravenoso: Metocroplamida de 10 mg se pasa lento + Difenhidramina</p>
<b>Tensional</b>	El mas comun	<p>Bilateral</p> <p>Dolor opresivo</p> <p>Se divide en Episódica y Crónica:</p> <p>Episódica: &lt; 15 días. ——— Frecuente: &gt; 10 crisis Infrecuente: &lt; 10 crisis</p> <p>Crónica: &gt; 15 días</p> <p>Factores desencadenantes: Estrés, ansiedad, fatiga y las malas posturas.</p>	s/n	+ Mujeres	30 Min - 7 dias	Leve - moderada	Clinico	<p>Infrecuente: Ibuprofeno de 600ml o Paracetamol de 1 Grs.</p> <p>Crónica: Amitriptilina de 12.5 mlg cada 24 horas por las noches y subir la dosis cada ——— Max 75 mlg semana</p>