



PEDIATRIA

**CUADRO SINOPTICO DE LA VALORACIÓN
NEONATAL.**

DR. JESUS ALEJANDRO MORALES.

RONALDO DARINEL ZAVALA VILLALOBOS

SEXTO SEMESTRE Gpo A

Comitán de Domínguez Chiapas a 01 De Marzo del 2025.

ETAPA NEONATAL

NEONATO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a un neonato como un niño menor de 28 días de vida.

PRINCIPALES ESCALAS UTILIZADAS EN VALORACION DEL RN.

CAOURRO

UTILIDAD

Valoración de la edad gestacional del recién nacido

PUNTOS A VALORAR

forma de la oreja (pabellón)	0, 8, 16, 24
tamaño de glándula mamaria	0, 5, 10, 15
formación del pezón	0, 5, 10, 15
textura de la piel	0, 5, 10, 15, 20
pliegues plantares	0, 5, 10, 15, 20

Suma 204 + puntaje obtenido Resultado/7

- POSTMADURO > 42SDG
- A TERMINO 37-41 SDG
- PREMATURO LEVE 35-36 SDG.
- PREMATURO MODERADO 32-24 SDG.
- PREMATURO EXTREMO <32 SDG.

SILVERMAN ANDERSON

UTILIDAD

Prueba que evalúa la dificultad respiratoria de un recién nacido

PUNTOS A VALORAR

Movimientos toraco abdominales	0, 1, 2
Tiraje intercostal	
Retracción xifoidea	
Aleteo nasal	
Quejido respiratorio	

PUNTAJE

- 0 normal
- 1-3 dificultad respiratoria leve
- 4-6 Dificultad respiratoria moderada
- 7-10 dificultad respiratoria severa

APGAR

UTILIDAD

Examen clínico que valora la vitalidad del recién nacido los primeros minutos de vida.

PUNTOS A VALORAR

Apariencia	0, 1, 2
Pulso	
Gestos	
Actividad	
Respiración	

PUNTAJE

- 7-10 Vigoroso, condición satisfactoria
- 4-6 levemente deprimido, asfixia moderada, apnea primaria
- 0-3 severamente deprimido, probablemente asfixia severa o grave, considerar apnea secundaria.

REFLEJOS DEL RN

SUCCIÓN

aparece de las 32 a las 35 SDG desaparece a los 24 meses.

BUSQUEDA

Aparece al nacer y desaparece a los 4-6 meses.

MORO

Aparece al nacer y desaparece a los 2 meses.

GALANT

20 SDG y desaparece a los 9 meses.

BABINSKI

Al nacer desaparece a los 2 años.

PRESIÓN PALMAR

28 SDG desaparece a los 6 meses

TONICO DEL COELLO

2 a 3 Semanas de nacido y desaparece de 4 a 6 meses.