



Itzel García Ortiz

Dr. Jesús Alejandro Morales Pérez

CUADRO SINÓPTICO. ETAPA NEONATAL

Pediatría

6° "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 03 de marzo de 2025

ETAPA NEONATAL

Signos vitales en el RN

Temperatura	36.5°-37.5°
FR	40-60 rpm
FC	120-160 lpm
pO2	86-95%
PAM	de acuerdo a

edad gestacional
peso
días de vida

Escalas para la valoración del RN

APGAR

Utilidad	Evaluar adaptación de un recién nacido a la vida fuera del útero	
Valoración	Tiempo	al primer minuto de vida Tolerancia del proceso de nacimiento 5 min posterior Evolución fuera del útero
	Signos	Apariencia Pulso / FC Gestos / Irritabilidad refleja Actividad/ Tono muscular Respiración / Esfuerzo respiratorio

MAS ALTO MEJOR

Puntaje de clasificación	- Sin depresión: 7 a 10 puntos	amerita atención
	- Depresión moderada: 4 a 6 puntos	
	- Depresión severa: 3 puntos o menos	

SILVERMAN ANDERSON

Utilidad	Evaluar dificultad respiratoria	
Valoración	Tiempo	10 min de vida
	Signos	Aleteo nasal Quejido respiratorio Tiraje intercostal Retracción esternal Disociación toracoabdominal

ENTRE MAS BAJO MEJOR

Puntaje de clasificación	DIFICULTAD RESPIRATORIA	Leve: 1-3 puntos	necesita de una asistencia a la ventilación.
		Moderada: 4-6 puntos	
		Severa: 7 a 10 puntos	
	SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA	0 puntos	

CAPURRO

Utilidad	DETERMINAR LA EDAD GESTACIONAL	
Valoración	Datos somáticos	1) Formación del pezón. 2) Textura de la piel. 3) Forma de la oreja. 4) Tamaño del seno (mama) y 5) Surcos plantares
	Formula	204 + puntaje parcial/ 7
Puntaje de clasificación	Prematuro extremo	<32 sem
	Prematuro Moderado	32-34 sem
	Prematuro leve	35-36sem
	A término	37-41 sem
	Postérmino	42sem o +

Principales reflejos en la evaluación inicial del RN

Reflejo de Moro	Edad de desaparición	6 meses
	Respuesta involuntaria de sobresalto	
Marcha automática	Edad de desaparición	2 meses
	Movimiento involuntario que realizan los RN cuando se los sostiene erguidos	
Reflejo de succión/búsqueda	Edad de desaparición	4 meses
	Busqueda	Se produce cuando se toca la mejilla o la comisura de los labios del bebé
	Succión	Se produce después del reflejo de búsqueda, cuando se estimula el paladar/labios del RN
Tonico del cuello	Edad de desaparición	4 meses
	Postura que se adopta cuando se gira la cabeza hacia un lado. El brazo del lado hacia el que se gira la cabeza se estira El brazo opuesto se dobla y flexiona, con el puño cerrado	
Prensión palmar	Edad de desaparición	5-6 meses
	Respuesta involuntaria, que consiste en cerrar los dedos alrededor de un objeto que toca la palma.	
Prension plantar	Edad de desaparición	10 meses
	Se produce al presionar la planta del pie o golpear suavemente la superficie plantar.	
Reflejo de Galant	Edad de desaparición	4 meses
	Respuesta automática a la estimulación de la piel en la zona lumbar	

BIBLIOGRAFÍA

Calle Poveda ,María José, et. Al (2019) FUNDAMENTOS DE PEDIATRÍA. Editorial: Mawil Publicaciones de Ecuador.

Alcántara González, Héctor Iván (2024) Generalidades de pediatría en fórmulas de utilidad en pediatría.

NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/5950/salud12_C/salud12_C.html

Detección, referencia oportuna y pautas de egreso hospitalario del recién nacido de término. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones. México, CENETEC; 2020 <http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/GPC-SS-226-20/ER.pdf>

Cuidados del recién nacido prematuro sano hospitalizado. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México, Instituto Mexicano del Seguro Social; 2018
<https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/362GER.pdf>

Wilfredo Leyton Lazo, Clara López Andrade (2020) Manual de signos vitales en la población infantil. Leyton Wilfredo, López Clara – Osorno: Editorial Universidad de Los Lagos <https://editorial.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/04/Manual-de-signos-vitales-en-la-poblacion-pediatrica.pdf>