



**Liliana Pérez López**

**Dr. Jesus Alejandro Morales Pérez**

**Cuadro sinóptico**

**Pediatría**

**Sexto semestre**

**Grupo "A"**

Comitán de Domínguez Chiapas a 05 de marzo de 2025.

# Etapa neonatal

## Signos vitales en RN

- FR { 40-60 lpm
- FC { 120-160 lpm
- Temperatura { 36.5-37.5 °C
- PA {
  - Sistólica { 50-70 mmHg
  - Diastólica { 25-50 mmHg
- SatO2 {
  - 1er minuto { 60%
  - 10 minutos { 90%

## Escalas

### APGAR

- Función {
  - Evaluación de vitalidad y adaptación del RN tras el nacimiento { Realizado en 1, 5 y 10 minutos
  - Evaluación del estado vigoroso { Evalúa presencia de asfixia perinatal
- Criterios que valora {
  - A { Apariencia
  - P { Pulso
  - G { Gesticulaciones
  - A { Actividad
  - R { Respiración
- Puntajes {
  - 7-10 {
    - Optimo {
      - Excelente condición
      - Vigoroso
      - Reactivo
      - Lpm +100
  - 4-6 {
    - Depresión moderada {
      - Cianosis moderada
      - Lpm -100
      - Hipotónico
      - Respiración irregular
  - 3 {
    - Depresión severa {
      - Cianosis general
      - Sin pulso
      - Flacidez muscular
      - Respiración ausente

### SILVERMAN ANDERSON

- Función {
  - Evalúa dificultad respiratoria
  - Aplicado en los minutos 1, 5 y 10
  - Realizado en RN
  - Aplicado en cuidados intensivos neonatales { UCIN
- Criterios que valora {
  - Movimientos toraco-abdominales
  - Tiraje intercostal
  - Retracción xifoidea
  - Aleteo nasal
  - Quejido espiratorio
- Puntajes {
  - 0 {
    - Sin dificultad respiratoria {
      - Sincronizado
      - Ausentes
      - Sin retracción
  - 1-3 {
    - Con dificultad respiratoria leve {
      - Hundimiento de tórax y abdomen
      - Mov. apenas visibles
      - Audible con estetoscopio
  - 4-6 {
    - Con dificultad respiratoria moderada {
      - Hundimiento de tórax y abdomen
      - Mov. apenas visibles
      - Audible con estetoscopio
  - 7-10 {
    - Con dificultad respiratoria severa {
      - Disociación toraco-abdominal
      - Mov. intensos visibles
      - Audible sin estetoscopio

### CAPURRO

- Función {
  - Determina la edad gestacional del RN
- Calculó {
  - Talla x 0.8 = Capurro +/- 2
  - Se suma 204 + puntaje parcial + 7
- Criterios que valora {
  - Forma de la oreja { Pabellón
  - Tamaño de la glándula mamaria
  - Formación del pezón
  - Textura de la piel
  - Pliegues plantares
- Puntajes {
  - Postmaduro { +42 SDG
  - A término { 37 a 41 SDG
  - Prematuro leve { 35 a 36 SDG
  - Prematuro moderado { 32 a 34 SDG
  - Prematuro extremo { -32 SDG

## Reflejos

- Segmentarios medulares {
  - Aparición { Tercer trimestre de gestación
  - Desaparición { Toda la vida
- Marcha automática {
  - Aparición { 34 SDG
  - Desaparición { 6 mes de vida
- Presión palmar {
  - Aparición { 28 SDG
  - Desaparición { 5 mes de vida
- Reflejo de moro {
  - Aparición { 32 SDG
  - Desaparición { 6 mes de vida
- Tónico de cuello {
  - Aparición { 36 SDG
  - Desaparición { 4 mes de vida
- Galant {
  - Aparición { 24 SDG
  - Desaparición { 4 mes de vida
- Presión plantar {
  - Aparición { 30 SDG
  - Desaparición { 10 mes de vida
- Paracaídas {
  - Aparición { Séptimo mes de vida
  - Desaparición { 10 mes de vida
- Busqueda {
  - Aparición { Nacimiento
  - Desaparición { 3-4 mes de vida
- Succión {
  - Aparición { 34-36 SDG
  - Desaparición { 5-6 mes de vida
- Babinski {
  - Aparición { 2 sem de vida
  - Desaparición { 12-24 mes de vida