



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN
MEDICINA HUMANA



ETAPA NEONATAL

PASIÓN POR EDUCAR

Citlali anayanci palacios coutiño
Pediatria
Dr. Jesus alejandro morales perez
1era unidad
6to semestre grupo A

PASIÓN POR EDUCAR

COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS A 26 de febrero de 2025

ETAPA NEONATAL

SIGNOS VITALES RN

FC: 120-160 L x M
FR: 40 a 60 R x M
TA: Sistólica: 50-70 mm de mercurio
Diastólica: 25 a 42 mm de mercurio
T°: 36.5 a 37.5 °C

APGAR

evalua adaptación y vitalidad
valora apariencia, pulso/FC,
gesticulación, actividad y respiración
dando 0, 1 y 2 puntos.
7-10 puntos= optimo
4-6 puntos= depresión moderada
<3 puntos= depresión severa

SILVERMAN ANDERSON

evalua la dificultad respiratoria del RN
Valora el aleteo nasal, quejido
expiratorio, tiraje intercostal, retracción
esternal y disociación toracoabdominal
dando 2, 1 y 0 puntos.
7-10= dificultad respiratoria severa
4-6= dificultad respiratoria moderada
0-3= dificultad respiratoria leve
0= sin dificultad respiratoria

CAPURRO

sirve para estimar edad gestacional
de un RN
Valora la forma de la oreja (pabellón),
tamaño de la glandula mamaria,
formación del pezón, textura de la piel
y pliegues plantales.
puntaje parcial: sumar 204+puntaje
obtenido y dividir resultado entre 7

CAPURRO

postmaduro >42 SDG
a término 37-42 SDG
prematuro leve 35-36 SDG
prematuro moderado 32-24 SDG
prematuro extremo <32SDG

REFLEJO DE MORO

consiste en sobresaltarse y
extender los brazos y piernas. Es
una respuesta involuntaria a la
estimulación, como un ruido fuerte o
la sensación de pérdida de apoyo.
Aparición: al nacer
Desaparece: 2 meses

REFLEJO SUCCIÓN

respuesta automática que permite
a los bebés alimentarse desde el
nacimiento. Es un reflejo arcaico
que se activa cuando se toca el
paladar o los labios del bebé.
Aparición: 32-36 SDG
Desaparición: 24 meses

REFLEJO DE BUSQUEDA

respuesta automática que tienen los
bebés recién nacidos para orientarse
hacia la fuente de alimento. Este reflejo
les ayuda a encontrar el pecho
materno o el biberón.
Aparición: al nacer
Desaparece: 4-6 meses

REFLEJO DE PRESIÓN PALMAR

se presenta si usted pone un dedo
en la palma de la mano abierta del
bebé. La mano se cerrará alrededor
del dedo. El intento de retirar el
dedo hace que el agarre se apriete.
Aparición: 28 SDG
Desaparece: 2-6 meses