

## PEDIATRIA

Alondra Monserrath Diaz Albores

Dr. Jesus Alejandro Morales Perez

Sexto semestre

Plataforma

PASIÓN POR EDUCAR

“A”

4ta unidad

# VIH

## EN EL BINOMIO.

### Definiciones

#### • Transmisión perinatal del VIH de madre a hijo.

Es la infección por el VIH transmitida de una madre infectada a su hijo durante el embarazo, el trabajo de parto, el nacimiento, o la lactancia materna.

#### • Transmisión vertical del VIH.

Infección por el VIH que puede ocurrir durante la gestación, alrededor del nacimiento (intraparto) o postparto (lactancia materna)

## 1. EMBARAZADAS

1

Tamizaje en la embarazada

#### • Primera consulta prenatal:

Realizar prueba rápida o serología (ELISA de 4.<sup>a</sup> generación).

#### • Tercer trimestre (32-34 semanas):

Repetir tamizaje si el resultado anterior fue negativo.

#### • Trabajo de parto sin tamizaje previo:

Realizar prueba rápida urgente.

2

Métodos diagnósticos

1. Prueba rápida para VIH.

**Si es positiva → confirmar con ELISA de 4.<sup>a</sup> generación y prueba Western Blot o inmunoensayo suplementario.**

2. Carga viral (ARN del VIH) y CD4+ en mujeres con diagnóstico confirmado.

3

Atención del trabajo de parto

#### • Mujeres con VIH sin tratamiento previo:

Iniciar zidovudina intravenosa (ZDV IV) lo antes posible.

#### • Si ya recibe TAR:

Continuar con su esquema habitual (no siempre se usa ZDV IV si tiene carga viral <50 copias/mL).

#### • Evitar procedimientos invasivos:

**No usar amniotomía temprana, monitoreo fetal interno o fórceps, si es posible.**

#### • Tipo de parto:

• Cesárea programada a las 38 semanas si la carga viral es >1000 copias/mL.

• Parto vaginal permitido si la carga viral es <1000 copias/mL.

## 2. SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO

