



Erivan Robely Ruiz Sánchez.

Dr. Jesús Alejandro Morales Pérez


Infografía “VIH EN EL BINOMIO”.

Pediatría.

Sexto “A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 28/06/2025.

VIH EN EL BINOMIO



TAMIZAJE EN LA EMBARAZADA

Todo embarazo debe incluir anamnesis y prueba rápida ELISA

Negativa

si existen factores de riesgo se repite inmediatamente, si no a los 3 meses

negativa

Se descarta VIH

Positivo

ELISA

WESTERN BLOT

Carga viral, linfocitos CD4

Iniciar TARc



DIAGNÓSTICO Y MANEJO DURANTE EL EMBARAZO

VIH (+):

Carga Viral : Medir la cantidad de virus en sangre.

Recuento de CD4: Evaluar el estado inmunológico.

Pruebas de Resistencia: Si la carga viral no disminuye con el tratamiento.

Inicio Temprano de Tratamiento ARV

ATENCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO

Estado Serológico Desconocido

Realizar una prueba rápida de VIH de inmediato.

Prueba Rápida Positiva

Administrar Zidovudina iv inmediata para prevenir la transmisión perinatal

Carga Viral Indetectable
Si la carga viral materna es <400 copias/mL cerca del nacimiento y se realiza cesárea por otras indicaciones, no se requiere administración de Zidovudina intravenosa.

EVITAR

Ruptura artificial de membranas
Uso rutinario de electrodos
Parto por fórceps y/o episiotomía.

Ruptura Prematura de Membranas (<37 semanas)

No Lactancia Materna

Evitar Lactancia Materna

SEGUIMIENTO EN EL RECIÉN NACIDO

Profilaxis Antirretroviral

Madres con Sospecha de Resistencia o Virus Resistente

Determinar la profilaxis ARV y con estudios de resistencia

Iniciar profilaxis ARV en el recién nacido

duración : 4 a 6 semanas

Esquema dependen de la carga viral materna

Tratamiento ARV anteparto/intraparto efectivo

Diagnóstico de la Infección por el VIH en el Recién Nacido (<18 meses)

dos resultados positivos PCR de RNA y/o DNA del VIH

Dos o más estudios virológicos negativos después de las ocho semanas de vida

exclusión definitiva

dos o más estudios virológicos negativos a los seis meses de vida

Profilaxis para Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*

Todos los niños expuestos al VIH perinatal