



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MEDICINA HUMANA

6 "A"

PEDIATRIA

DIARREA AGUDA



CATEDRATICO:

DR. JESUS ALEJANDRO MORALES PÉREZ

ALUMNA:

MARIA CELESTE HERNANDEZ CRUZ

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS; 24/05/2025



- PREVENCIÓN PRIMARIA**
- Protección específica (vacunación contra Rotavirus)
 - Lavado de manos
 - Manejo correcto de alimentos

PREVENCIÓN PRIMARIA	PREVENCIÓN SECUNDARIA	PREVENCIÓN TERCERA
PREVENCIÓN DE LA SALUD LACTANCIA No dejar al niño sin lactancia materna Lavado de manos Manejo correcto de alimentos	PROTECCIÓN ESPECÍFICA Vacuna contra el ROTAVIRUS	DIAGNÓSTICO PRECOZ Y TRATAMIENTO OPORTUNO Evaluación y clasificación del estado de hidratación Identificar datos de alarma Lactancia materna Incrementar la ingesta de líquidos Salas de rehidratación oral
	LIMITACIÓN DEL DAÑO Referencia oportuna Uso adecuado de antibióticos y otros fármacos	REHABILITACIÓN Manejo de los síntomas cuando existen complicaciones a la lactancia

- COMPLICACIONES**
- Alteraciones del equilibrio ácido base
 - Alteraciones hidroelectrolíticas
 - Uremia
 - Desnutridos graves
 - Fracaso de la hidratación (DESHIDRATACIÓN)
- solicitar los estudios de laboratorio

Se debe realizar la investigación microbiológica en

- Evacuaciones con sangre, moco y/o pus
- Diarrea por más de siete días
- Paciente con inmunosupresión
- Desnutrición moderada o grave
- Lactante menor a tres meses
- Enfermedades crónicas concomitantes

TRATAMIENTO

Se debe utilizar en pacientes con diarrea aguda SRO hipotónicas (sodio de 50 a 60 mmol/l) y SRO de baja osmolaridad (sodio de 75 mmol/l). Con desnutrición el uso de ReSoMal.



Se recomienda el uso de ondansetrón para disminuir los síntomas de náusea y vómito

- 8-15 kg: 2 mg
- 15-30 kg: 4 mg
- >30 kg: 8 mg

