



Carolina Hernández Hernández

Dr. Jesús Alejandro Morales Pérez

Tarea

PASIÓN POR EDUCAR

Infografía

6 "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de junio del 2025.

VIH en el Binomio

Embarazo 🤰 → Parto 🤱 → RN 🧒 → Seguimiento 🩺

TAMIZAJE EN LA EMBARAZA

◆ Prueba rápida ¿A quién? A todas las embarazadas

- ◆ ¿Cuándo? 1ª consulta prenatal <12 semanas
- Repetir en el 3º trimestre si hay factores de riesgo

◆ ¿Cómo? Prueba rápida o ELISA + Reactivo → confirmar con Western Blot o IA 4ª generación

📌 Factores de riesgo para repetir tamiz:


- ITS recientes, Uso de drogas, Nuevas parejas, Diagnóstico tardío



2. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS (EMBARAZADA)

Tamizaje inicial: Prueba rápida o ELISA

◆ Confirmación: Western Blot o Inmunoensayo (IA) 4ª generación, Medir carga viral y CD4+ tras confirmación
Conteo de los linfocitos T CD4+



3. MANEJO DURANTE EL EMBARAZO

📌 Iniciar TAR (ideal <14 semanas)

📄 Esquema preferido:

Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir

🔄 Control mensual de carga viral

🔍 Evaluación de adherencia

✉ Referencia a 2º o 3º nivel



4. TRABAJO DE PARTO

● Carga viral <50 copias/mL → Parto vaginal seguro

● Carga viral ≥50 copias/mL → Cesárea programada a las 38 semanas

Tener en cuenta el conteo de los linfocitos TCD4 +

🚫 Evitar: Amniotomía temprana, Maniobras traumáticas, Instrumentación, Lactancia si no hay supresión viral

📌 Continuar TAR durante el trabajo de parto



5. MANEJO DEL RECIÉN NACIDO

📌 PROFILAXIS ANTIRRETROVIRAL

🕒 Iniciar en las primeras 2 horas de vida

• Riesgo bajo (madre con TAR y carga viral <50):

• 📌 Zidovudina x 4 semanas

• Riesgo alto (madre sin TAR o carga viral alta):

• 📌 Zidovudina + Lamivudina + Nevirapina x 6 semanas



6. ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS EN EL RN

📌 PCR-VIH-1 cualitativa:

• Día 14-21


• Semana 4-6

• Mes 4-6

• 🔄 Confirmación: 2 PCR positivas

• 🔍 ELISA a los 18 meses si PCR no concluyente

• Conteo de linfocitos T CD4 + (No rutinario)



BIBLIOGRAFIA:

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). (2010). Guía de Práctica Clínica: Prevención, diagnóstico y tratamiento de la transmisión perinatal del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el binomio madre-hijo. Secretaría de Salud.

<http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/SS-033-10/ER.pdf>