

**Ricardo Alonso Guillen Narváez**

**Dr. Jesus Alejandro Morales Pérez**

**Cuadro sinoptico**

**Pediatría**

**Sexto semestre**

PASIÓN POR EDUCAR

**“A”**

# ETAPA NEONATAL

## Signos vitales

Recién nacido	FC	120-160 lpm
	FR	40-50 rpm
	Temperatura	36.6-37.4 °c
	TA	70-45 mmHG
Lactante menor	FC	120-120 lpm
	FR	30-40 rpm
	Temperatura	36.5-37.4 °c
	TA	90-50 mmHG
Lactante mayor	FC	110-130 lpm
	FR	20-30 rpm
	Temperatura	36.5-38.4 °c
	TA	90-60 mmHG
Preescolar	FC	90-110 lpm
	FR	20-25 rpm
	Temperatura	36.8-37 °c
	TA	100-60 mmHG
Escolar	FC	80-115 lpm
	FR	18-20 rpm
	Temperatura	36.8-37 °c
	TA	100-60 mmHG
Adolescente	FC	60-100 lpm
	FR	16-20 rpm
	Temperatura	36.8-37.2 °c
	TA	110-70 mmHG

## Escalas

APGAR	¿Qué es?	Método de evaluación para verificar la adaptación del bebé	
	Cuando se toma	1 minuto	Tolerancia del bebé al nacimiento
		5 minutos	Evolución del bebé fuera del vientre
	Criterios a evaluar	Apariencia	
Pulso			
Gesticulación			
Actividad			
Respiración			
Puntajes	7-10 puntos (normal)	Recién nacido en buenas condiciones	
	4-6 puntos (depresión moderada)	Puede ser necesario algunas maniobras de RCO neonatal y monitoreo post recuperación	
	<3 puntos (depresión severa)	RCP neonatal avanzado, más medicación, monitoreo en UCI	
Silverman-Anderson	¿Qué es?	Escala que ayuda a evaluar la dificultad respiratoria del recién nacido	
	Criterios a evaluar	Aleteo nasal	
		Movimientos toracoabdominales	
		Quejido respiratorio	
Retracción xifoidea			
Tiraje intercostal			
Puntaje	0 puntos	Sin dificultad respiratoria	
	1-3 puntos	Leve dificultad respiratoria	
	4-6 puntos	Moderada dificultad respiratoria	
	7-10 puntos	Severa dificultad respiratoria	
Capurro	¿Qué es?	Escala clínica que se utiliza para calcular la edad gestacional y postconcepcional de los recién nacidos	
	Criterios a evaluar	Formación de la oreja	
		Tamaño de las glándulas mamarias	
		Formación del pezón	
Textura de la piel			
Pliegues plantares			
Fórmula	$\text{Puntaje} + 204 / 7$	Semanas de gestación	

## Reflejos

Tónico del cuello	Desaparece a los 6 meses
Succión	Desaparece a los 6-7 meses
Babinski	Desaparece a los 12-24 meses
Suprapúbico	Desaparece al mes
Marcha automática	Desaparece a las 2 meses
Presión plantar	Desaparece a los 10 meses
Búsqueda	Desaparece al mes
Galant	Desaparece a los 5 meses
Moro	Desaparece a los 4 meses
Presión palmar	Desaparece a los 3-5 meses