



MEDICINA PALIATIVA

MARIO MORALES ARGUETA

MAPA CONCEPTUAL

6° "A"

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez, Chiapas a 07 de marzo de 2025

Caquexia y anorexia

DEFINICIÓN

Marcada baja de peso con compromiso de masas musculares.

Perdida de apetito.

Síntomas frecuentes 50-90%

Asocia y contribuye a la fatigabilidad

Empeoran la calidad de vida

Etiología Caquexia

Enfermedad DEL TRATAMIENTO CONCURRENTES

Metabolismo alterado DROGAS OPIOIDES ANOREXIA

Trastornos inmunológicos (IL-1 Y 6, TNF) VOMITOS

DIARREA

HEMORRAGIAS

Etiología (anorexia)

De la enfermedad Del tratamiento Otros

Retardo del vaciamiento gástrico Drogas (alteraciones del sabor o del vaciamiento gástrico) Ansiedad

Insuficiencia renal/hepática Tema principal 1 Depresión

Dolor/disfagia

Náuseas/vómitos

Sepsis

Deshidratación

Evaluación

Intensidad de los síntomas (escala)

Hábitos y preferencias nutricionales

Examen físico dirigido a buscar alteraciones del tubo digestivo

Realizar medidas antropométricas para evaluar grado de desnutrición

MANEJO

EVALUAR NECESIDAD DE TRATAMIENTO DE ESTE SINTOMA EN FUNCION A LAS REPERCUSSIONES PARA EL PACIENTE.

EXPLICAR EL ORIGEN DEL SINTOMA Y DETERMINAR CON EL ENFERMO EL TIPO Y OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO.

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS GENERALES

MEJORAR FACTORES AMBIENTALES Y DISMINUIR SINTOMAS CONCOMITANTES

EVALUAR SUSPENSIÓN DE OPIACEOS Y EVENTUAL ANALGESIA INTERVENCIONAL

BUSCAR ALTERNATIVAS DE ACUERDO A SUS PREFERENCIAS

MEDIDAS FARMACOLOGICAS

ACETATO MAGESTROL DROSIS: 80-800 MG/DÍA

ESTIMULANTE DEL APETITO Y GANANCIA DE PESO PRINCIPALMENTE EN MASA

EFFECTIVIDAD: 80%

EFFECTOS SECUNDARIOS: DISMINUYE NAUSEAS Y VOMITOS.

CORTICOIDES DEXAMETASONA DROSIS: 2-4 MG CADA 12 HRS

EFFECTO DE CORTA DURACIÓN (NO INDICADO EN MÁS DE 4 SEMANAS)

EFFECTOS SECUNDARIOS: INTOLERANCIA A LA GLUCOSA, INFECCIONES Y EVENTUALMENTE PSICOSIS Y EUFORÍA.

CRIPOHEPTADINA DROSIS: 4 MG CADA 8 HRS

ESTIMULANTE DEL APETITO

EFFECTOS SECUNDARIOS: RESEQUEDAD DE BOCA, SOMNOLENCIA E INFRECUEMENTE ATAXIA.