



MEDICINA PALIATIVA

MAPA CONCEPTUAL DE ANOREXIA Y CAQUEXIA.

DR. ROMEO ANTONIO MOLINA ROMAN.

RONALDO DARINEL ZAVALA VILLALOBOS

SEXTO SEMESTRE Gpo A

Mi Universidad

Comitán de Domínguez Chiapas a 26 febrero del 2025.

CAQUEXIA Y ANOREXIA

Marcada baja de peso con compromiso de masas musculares.
Caracterizada por la pérdida de apetito.

Síntomas frecuentes
50-90%

Asocia y contribuye a la fatigabilidad

Empeoran la calidad de vida

ETIOLOGIA ANOREXIA

ENFERMEDAD

Retardo de vaciamiento gástrico, insuficiencia renal, alteraciones electrolíticas dolor, náuseas, fatiga, sepsis, constipación o deshidratación

DEL TRATAMIENTO

por la alteración del sabor por consumo de drogas.

AMBIENTALES

malos olores, demasiada comida, gustos personales

OTROS

ansiedad y depresión

ETIOLOGIA CAQUEXIA

ENFERMEDADES

Metabolismo alterado

Trastornos inmunológicos
(IL-1 Y 6, TNF)

TRATAMIENTOS

OPIOIDES

CONCURRENTES

ANOREXIA

Vómitos, diarrea, hemorragias

EVALUACIÓN

Intensidad de los síntomas (escala).
Hábitos y preferencias nutricionales.

Examen físico dirigido a buscar alteraciones del tubo digestivo.

Realizar medidas antropométricas para evaluar grado de desnutrición.

MANEJO

Evaluar necesidades de tratamiento de los síntomas en función a las repercusiones

Explicar el origen del síntoma y determinar el con el paciente el objetivo del tratamiento

Medidas generales como el aumento de colaciones en menor cantidad, alimentación por familiar, hacer la hora de la comida un ambiente agradable y estimular la higiene bucal.

MEDIDAS FARMACOLOGICAS

ACETATO MAGESTROL

Dosis: 80-800 mg/día

- Estimulante del apetito y ganancia de peso principalmente en masa grasa.
- Efectividad: 80%.

- Efectos secundarios: disminuye náuseas y vómitos. se asocia a aumento de incidencias de tvp.

CORTICOIDES DEXAMETASONA

• Dosis: 2-4 mg cada 12 hrs

- Efecto de corta duración (no indicado en más de 4 semanas)
- Efectos secundarios: intolerancia a la glucosa, infecciones y eventualmente psicosis y euforia.

CRIPOHEPTADINA

• Dosis: 4 mg cada 8 hrs

- Estimulante del apetito

- Efectos secundarios: resequeza de boca, somnolencia e infrecuentemente ataxia.