

Universidad del Sureste
Campus Comitán
Licenciatura en Medicina Humana



Materia: ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Docente: DR RODOLFO MEDELLIN

Alumno: Leonardo Domínguez Turren

Grado: 6to semestre Grupo: "A"

Proyecto: CUADRO COMPARATIVO DENGUE, ZIKA,
CHIKUNGUNYA

Fecha: 23 de MAYO DE 2025

Lugar: Comitán de Domínguez Chiapas

PATOLOGIA	DEFINICION	AGENTE ETIOLOGICO	VECTOR	CLASIFICACION	CUADRO CLINICO	DX	TX	CONSIDERACIONES ESPECIALES
Dengue	Enfermedad infecciosa viral sistémica, dinámica que se transmite por el mosquito <i>Aedes aegypti</i> y <i>Aedes albopictus</i> . Cursa con cuadro clínico amplio.	Enf. causada por Arbovirus 4 serotipos: DENV 1, DENV 2, DENV 3 y DENV 4. Virus del dengue Flavivirus RNA	Mosquito <i>Aedes Aegypti</i> y <i>Aedes albopictus</i> .	A) Dengue sin signos de alarma B) Dengue con signos de alarma. C) Dengue grave.	Fiebre del 1er al 5to día. Nauseas/Vómito Exantema Mialgias y artralgias Cefalea y dolor retro ocular Petequias y leucopenia.	- Clínica + RT-qPCR Triplex (primeros 5 días). - Clínica + Antígeno NS1 (ceros & días). - IgM (a partir del 5to día)	→ Sintomático en DSSA. Reposo en cama y uso de paracetamol líquidos y O. → DSA y Dg: Hospitalización y reposición de cristales IV. Evaluación Hematocrito.	→ Embarazadas: Hospitalización No cesarean - usar solo Sol. Hartmann y salina al O.9-1. → Pediatría: Toma de muestra uso de paracetamol líquidos Chocques. → Comorbilidades: Dg con mayor tasa de mortalidad AHS, DM2. Valorar uso de Farmacos.
Zika	Virus transmitido por mosquito de Uganda en 1947 en mono Macaco y en 1950 se detectó en humanos en África.	Virus del Zika Carbovirus, género Flavivirus, Fam. Flaviviridae. Periodo de incubación 3-12 días.	Mosquito <i>Aedes Aegypti</i>	- Fiebre 38-39° - Cefalea - Conjuntivitis no purulenta - Mialgias/artralgias - Purpura - Edema periorbitario.	Exantema con maculaz de los sig: - Fiebre - Conjuntivitis - Cefalea - Artralgias - PCR de ARN Viral.	→ Tx sintomático Evitar Aspirina y AINES	Complicaciones: - Sí de Guillain-Barré - Microcefalia - Problemas Neurológicos - Sordera o hipoacusia - Anomalías Oculares - Contraictivos - Bajo peso al nacer.	
Chikungunya	"El que se encarna" En lengua Africana	Virus del Chikungunya VCHIK ARN Flavivirus Togaviridae Periodo de incubación 1-12 días.	Mosquito <i>Aedes Aegypti</i> y <i>Aedes albopictus</i>	3 Fases: 1) Aguda 3-10 días 2) Subaguda 2-3 meses 3) Crónica. 73 meses hasta 3 años.	- Fiebre de inicio súbito 39° - Artralgia severa manos y tobillos - Eritema maculopapular tronco y extremidades. - Cefalea, lumbalgia, Nauseas, Mialgias, Numbos, Conjuntivitis.	- RT-PCR de ARN viral primeros 5 días - IgM a los 6 días de Fiebre.	* Sintomático y Reposo en cama - Paracetamol - Oxido de Zinc - Antihistamínicos - AINES para artralgias - Unicamente en Fase 2.	→ Embarazadas: → Niños → Adultos Mayores → Niños