



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

CUADRO COMPARATIVO DE DENGUE, ZIKA CHINKUNGUNYA.

DR. MEDELLIN GILLEN ADOLFO.

RONALDO DARINEL ZAVALA VILLALOBOS

SEXTO SEMESTRE Gpo A

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de mayo del 2025.

PATOLOGIA	DENGUE	ZIKA	CHINKUNGUNYA
DEFINICIÓN	Enfermedad febril infecciosa, de etiología viral sistémica.	Enfermedad infecciosa causada por el virus del (Zika)	Enfermedad viral, caracterizada por fiebre, dolor articular y muscular intenso (El que se encorba)
AGENTE ETIOLÓGICO	Virus. DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4	(Virus del Zika) Arbovirus = Género Flavivirus Familia = Flaviviridae	(Chikungunya) ARN, Género alphavirus familia Togaviridae
VECTOR	• Aedes Aegypti • Aedes Albopictus.	• Aedes Aegypti	• Aedes aegypti • Aedes Albopictus.
CLASIFICACIÓN	• Sin signos de alarma • Con signos de alarma • Grave.	• Flaviviridae del género Flavivirus	• Aguda • Sub Aguda • Crónica
CUADRO CLÍNICO	Fiebre del 1 al 5to día, Náuseas, Vómito, exantema, mialgias, cefalea, artralgias, dolor retroocular, petequias, leucopenia.	Fiebre de 38-39°C, Cefalea, Conjuntivitis no purulenta, hiperemia, artralgias, mialgias, edema periartricular, prurito, dolor retroocular, exantema maculopapular pruriginoso.	Fiebre aguda >39°C, Artralgias Surtos y limitante en manos y tobillos, eritema maculopapular de tronco y extremidades, cefalea, lumbalgia, náuseas, mialgias, vómito, conjuntivitis no purulenta.
DIAGNÓSTICO	NSI en los primeros 5 días de fiebre, RT-PCR con transcriptasa (para confirmar Dx). IgG (Infección pasada) (IgG y IgM) = Resp. de 5-7 de la enfermedad.	PCR de ARN Viral en los primeros 5 días del cuadro clínico PRTN, IgG, IgM.	PT-PCR de ARN: Viral durante los primeros 5 días, (IgM) a los 6 días de iniciar fiebre, y (CLÍNICO)
TRATAMIENTO	Paracetamol, hidratación (VSO), medios físicos, (NO AINES), (NO med. IM.), (NO ESTEROIDES), (NO INTRATECALES) (AMV).	Reposo, hidratación, paracetamol, evitar uso de ASS y AINES.	(SINTOMÁTICO), Reposo en cama, medios físicos, paracetamol, óxido de zinc, Antihistamínicos, en caso de prurito AINES para Artralgias.
CONSIDERACIONES ESPECIALES.	Hospitalización a embarazadas, infancia, edad avanzada, obesidad, DM, Ins. renal, Enf. hemolíticas crónicas.	Grupos vulnerables, Recién nacidos, adultos mayores, embarazados.	Personas con enf. crónicas, embarazadas, niños, personas de la 3ra edad, (Aislamiento) (Monitoreo Sig. Vital).