



MARIO MORALES ARGUETA

DR. MEDELLÍN GUILLÉN ADOLFO

RESUMEN

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

6° "A"

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez, Chiapas a 05 de abril de 2025

OTITIS AGUDA EXTERNA

Inflamación difusa del canal auditivo externo que involucra al pabellón auricular o membrana timpánica.

- 10% población adulta
- 98% bacteriana
- 70% s. aureus
- 60% p. aeruginosa

Prevención primaria

- Uso de cotonetes.
- Secar concha de oído gentilmente
- Evitar manipulación CAE con cualquier objeto

Para nadadores:

- Secar CAE con secador de cabello
- Utilizar tampones blandos

Para uso de dispositivos auditivos

- Limpieza y ventilación diaria del dispositivo
- Uso estrictamente personal

Clínica:

- Inicio rápido de sintomatología (<48 hrs)
- Síntomas de inflamación de CA
- Plurito ótico
- Plenitud otica
- Dolor de mandíbula
- Disminución auditiva

Signos de inflamación de CA

- Signos del trago (+)
- Eritema y edema de conducto auditivo

Diagnostico

- Dx de OEA es clínico y requiere otoscopia
- En caso de que la otoscopia resulte normal se debe investigar otras causas de otología
- Disfunción de la articulación temporomandibular
- Faringitis o amigdalitis
- Artritis de la columna cervical
- Dolor neuropático

Tratamiento

- Gotas esteroideas o Atb con acido acetico
- (tiempo de recuperación 14 dias)
- Neomicina + dexametasona + acido acetico

Tx farmacologico

- Humidificación alcalinización y sobre infección:
- Secar
- Acidificar
- Desinfectar

OTITIS MEDIA AGUDA

Caracterizada por inicio agudo de signos y síntomas de inflamación del oído medio

Síntomas presentes alrededor de 3 días y 1 semana

Etiología:

- virus y bacterias 55%
- H. influenzae
- S. pneumonie
- M. catarrhalis

Epidemiología y factores

- 90% de niños menores de 5 años
- 1/3 de las otitis son OM con derrame

Fx no modificables:

- Edad
- Genero masculino
- Orígenes étnicos (caucásicos)
- Gemelo en guardería
- Nacimiento prematuro
- Atopia

Fx modificables:

- Acudir a guardería
- Tipo de alimentación
- Exposición a tabaquismo
- Uso de pacificadores
- Obesidad

Diagnostico:

- Otoscopia neumática 94% eup y 80% esp
- Otagia
- Fiebre (no especifica)
- Hiperemia intensa
- Perdida de reflejos luminosos
- Opacificación o color amarillo

Tratamiento:

- Antibiotico temprano
- Niños <2 años
- Amoxicilina/ acido clavulánico
- Clamoxin