



José Carlos Cruz Camacho

Dr. Adolfo Bryan Medellín Guillén

Cuadro comparativo

Enfermedades infecciosas

6°

“A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de Mayo del 2025.

PATOLOGIA	DENGUE	ZIKA	CHINKUNGUNYA
Definición	E. Infecciosa Viral Sistémica y Dinámica, Cursa con un Cuadro clínico amplio	Es un Virus transmitido por mosquitos (1447 mono) (1450 humano). en otros Países Africanos.	Enfermedad viral transmitida de los mosquitos a los humanos Significa: Doblar o Encorvarse 1-12 días P. Incubación.
Etiología	Cuenta con 4 serotipos Principalmente: - Arbovirus - RNA. - Flavivirus	Virus del Zika - Arbovirus - flavivirus - Flaviviridae	Virus (UCHIK) ARN genero Arbovirus Familia togaviridae
Vector	- Mosquito Aedes aegypti - Aedes albopictus (hembras).	Mosquito Aedes aegypti	Mosquito Aedes aegypti A. albopictus
Clasificación	Sin datos de alarma: Fiebre, Nausea, vómito, Leucopenia Con signos de alarma: Dolor abdominal, vómito recurrente, Plaquetoopenia. Grave: Fuga plaquetaria, Hemorragia.	No tiene una clasificación como tal, Pero si complicaciones, Asociadas: - Microcefalia - hipocuesia - Guillain Barré - bajo peso al nacer. - Sordera	Aguda: 3-10 días Fiebre de inicio súbito $>39^{\circ}\text{C}$ Subaguda: 2-3 meses post infección Crónica: >3 meses, 18 meses a años.
Cuadro Clínico	Nauseas, vómito Exantema (mialgias), Artralgias cefalea, Dolor retroocular, Petequias, Leucopenia.	Exantema 3-5 días después del inicio de la fiebre, ± 2 días sin. Fiebre $38-39^{\circ}\text{C}$, cefalea, conjuntivitis, prurito, Dolor retroocular.	Fiebre, Rash, conjuntivitis, Artralgias, Artritis inflamatoria, cefalea mialgias.
Diagnostico	5 días: Clínico, RT-qPCR Triplex. Confirmatorio por triplex clínica + NS2 >6 días: IgM, IgG	Exantema ± 2 síntomas. Rx Epidemiológica haber estado en contacto sexual con persona infectada. PCR ARN viral 5 días.	PCR-RT de ARN Primeros 5 días IgM 6 días iniciada la fiebre.
Tratamiento	Paracetamol de elección No Forma. → Reposo, hidratación. evitar Aspirina educar al Px de signos de A.	Paracetamol No farmacológico: Reposo, Hidratación.	Sintomático, Reposo en cama, Fiebre: medios fríos, y paracetamol erupciones cutáneas: zinc y antihistamínicos
C. Especiales.	- Embarazadas: Reanimación hidrática. - Adultos mayores: Vigilancia. - pediátricos: No suspender lactancia, A, electrolitos.	contacto sexual sin protección 2 semanas previas a la aparición de los síntomas, en las 8 semanas previas.	Fase aguda No usar AINES (7 días después).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- *Salud, S. de Guía de prrãctica clínica dengue, gob.mx.*
- *De, G., R. (n.d.). GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA GPC Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el VIRUS CHIKUNGUNYA.*
- *INFECCIÓN POR VIRUS ZIKA EN MÉXICO. (2016).*