



Esmeralda Jiménez Jiménez

DR. De la Rosa Pacheco Raul

**Cuadro comparativo de Cefaleas
Primarias**

Neurología

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6°

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 7 Abril de 2025

Cefalea primarias	Definición	Síntomas asociados	Epidemiología	Duración/intensidad	Diagnostico	Tratamiento
Tensional	Dolor leve o moderado descrito a menudo como la sensación de tener una banda ajustada alrededor de la cabeza.	<ul style="list-style-type: none"> •Bilateral •Opresivo •Min- Días •Leve-Moderada •No hay náuseas y Vómitos •No afecta la act. Física 	<ul style="list-style-type: none"> •+ frecuente en mujeres •tipo de dolor de cabeza más común y afecta a entre el 30% y el 78% de la población 	<p>Tensional Se ÷ 2-></p> <p>♡ Episódica (<15 días) y esta se ÷ en</p> <ul style="list-style-type: none"> •Frecuente >10 crisis •Infrecuente. < 10 días <p>♡Crónica (>15 días)</p>	Clinico/Anamnesis	<ul style="list-style-type: none"> •AINES o Paracetamol 1 gr V.O •Ibuprofeno 600mg V.O •Aspirina 100-150mg •Metrocloramida 10mg + Difenhidramida 25 mg si es muy severo •Cronica= Amitriptamina 12.5 mg hasta llegar a 75mg
Migraña	Intensidad variada, usualmente acompañada de náuseas y sensibilidad a la luz y el sonido.	<ul style="list-style-type: none"> •Unilateral •Pulsatil •4-72 hrs •Moderada/severa •Si afecta la Act. Física •Con náuseas y Vómitos 	<ul style="list-style-type: none"> •Mujeres •Cambios hormonales •Cambios de la Temperatura 	<p>(5 ataques)</p> <p>Se ÷ en:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Con Aura (25%) •Sin aura(75%) 	Clínico/Anamnesis	<ul style="list-style-type: none"> •Paracetamol 1gr V.O •Ibuprofeno 600mg V.O •triptanos •Metrocloramida 10mg y Difenhidramida 25mg
Cefalea en Racimo	Cefalea muy dolorosa.	<ul style="list-style-type: none"> •Dolor agudo o punzante extremo, generalmente en, detrás o alrededor de un ojo. •Dolor en un lado de la 	<p>Afecta a entre 0,05% y 0,4% de la población general.</p> <p>Es más frecuente en hombres y suele</p>	<ul style="list-style-type: none"> •15- 180 mnts <p>Un solo ataque puede durar de 15 minutos a tres horas, pero lo más frecuente es que dure de 30 a 45 minutos.</p>	<p>Descripción del dolor, su localización, su intensidad y otros síntomas</p> <ul style="list-style-type: none"> •Neurólogo 	<p>La cefalea en racimos no tiene cura. El objetivo del tratamiento es disminuir el dolor, acortar el periodo de</p>

		<p>cabeza en un solo racimo</p> <ul style="list-style-type: none">•Enrojecimiento del ojo del lado que duele.•Sudoración	<p>aparecer entre los 20 y los 40 años de edad.</p>			<p>cefalea y prevenir nuevos ataques.</p> <ul style="list-style-type: none">•Triptanos
--	--	---	---	--	--	--