



**Lizeth Guadalupe Ramírez Lozano**

**Dr. Raúl de la Rosa Pacheco**

**Cuadro comparativo: Cefaleas  
primarias**

**Neurología**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**6°**

**“B”**

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de abril 2025

	Tensional	Migraña	Racimo
<b>Definición</b>	Es la variedad más común de cefalea, con predominancia occipitonuclear, temporal o frontal o extensión difusa sobre el vértice del cráneo.	Frecuencia elevada reconocible por cefalea periódica, inicia en la infancia, adolescencia o al principio de la vida adulta y recurre con menor frecuencia con el paso de los años.	Es un tipo de cefalea muy dolorosa, periodos de ataques frecuentes en racimos, pueden despertar a las personas del sueño, causan un dolor intenso en un ojo o alrededor de él, en un lado de la cabeza.
<b>Características</b>	Opresiva Bilateral No afecta la act. física Episódica <15 días <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frecuente &gt;10 crisis</li> <li>• Infrecuente &lt; 10 crisis</li> </ul> Crónica >15 días	Unilateral Pulsátil Afecta act. física <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con aura</li> <li>• Sin aura</li> </ul>	Unilateral Edema periorbital
<b>Síntomas asociados</b>	No tiene	Náuseas Vómito	Rinorrea Lagrimeo Edema y ptosis palpebral Miosis
<b>Epidemiología</b>	Predominio en mujeres	Predominio en mujeres	Sexo masculino Predominio nocturno
<b>Duración</b>	De minutos a días 30 min – 7 días	4 hrs – 72 hrs	15 – 180 min (45 min promedio)
<b>Intensidad</b>	Leve a moderado	Moderado a severo	Moderado – severo (más severo)
<b>Diagnóstico</b>	Anamnesis	Anamnesis/clínica	Anamnesis/clínica
<b>Tratamiento</b>	Aines Ibuprofeno 600 mg VO Paracetamol 1 gr VO Aspirina 100-150 mg	Paracetamol Ibuprofeno Vo/sublingual 2.5 – 5 mg zolmitriptalina	Sumatriptán 50 – 100 mg VO O2 al 100% 10 – 15 min

## Bibliografía

[Adams, R. D., Victor, M., & Ropper, A. H. \(1997\). \*Principles of Neurology\*. McGraw-Hill Companies.](#)