



Oscar Eduardo Guillén Sánchez

Dr. Raúl de la Rosa Pacheco

Neurología

PASIÓN POR EDUCAR

Cuadro comparativo

6to

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de abril del 2025

TIPOS DE CEFALEA

	CEFALEA TENSIONAL	MIGRAÑA	CEFALEA EN RACIMOS
DEFINICION	CEFALEA PRIMARIA MAS COMUN, OBTENIENDO UN DOLOR DE TIPO OPRESIVO, GENERALMENTE BILATERAL	CEFALEA QUE PUEDE CAUSAR DOLOR PULSATIL INTENSO O UNA SENSACION PULSANTE GENERALMENTE DE UN SOLO LADO	TRASTORNO EPISODICO CON DOLOR PULSATIL UNILATERAL Y SINTOMAS NEUROLOGICOS ASOCIADOS
CARACTERISTICAS	<ul style="list-style-type: none"> DOLOR TIPO BANDA O PRESION ALREDEDOR DE LA CABEZA. 	<ul style="list-style-type: none"> PULSATIL 	<ul style="list-style-type: none"> PREDOMINIO NOCTURNO PERIOCLAR
SINTOMAS ASOCIADOS	<ul style="list-style-type: none"> SIN SINTOMAS 	<ul style="list-style-type: none"> CON AURA: FOSFENOS, DETELLO, NAUSEAS, 60 MIN CEFALEA OCACIONADO POR UNA VASODILATACION. SIN AURA: SIN SINTOMAS 	<ul style="list-style-type: none"> RINORREA LAGRIMEO EDEMA PALPEBRAL MIOSIS
EPIDEMEOLOGIA	MAS FRECUENTES EN MUJERES	MAS FRECUENTES EN MUJERES	MAS FRECUENTES EN HOMBRE
DURACION	MINUTOS A DIAS	<ul style="list-style-type: none"> Episódica---- <15 días Crónica----->15 días 	<ul style="list-style-type: none"> 15 A 180 MIN CON UN PROMEDIO DE 45 MIN.
INTENSIDAD	LEVE-MODERADA	MODERADA-SEVERA	MODERADA-SEVERA
DIAGNOSTICO	<ul style="list-style-type: none"> CLINICA ANAMNESIS(ALICIA) 	<ul style="list-style-type: none"> CLINICA ANAMNESIS(ALICIA) 	<ul style="list-style-type: none"> CLINICA ANAMNESIS(ALICIA)
TRATAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ASPIRINA 100 A 150 MG METOCOPRAMIDA 10 MG + DIFENHIDRAMINA 25 MG EN CASO DE NO PODER ADMINISTRAR VIA ORAL SERA EN IV. CRONICA: AMINOTRIPTANO INICIO DE 12.5 MG Y CADA SEMANA AUENTAR 12.5 HASTA LLEGAR A 75 M. PARACETAMOL 1 GR Y IBUPROFENO 600MG 	<ul style="list-style-type: none"> PARACETAMOL 1 GR O IBUPROFENO 600 MG SI NO TOLERA VIA ORAL ADMINISTRAR TRIPTANOS (ZOLMIPRIPTLINA 2.5-5 MG) DOLOR MUY SEVERO QUE INCAPACITA REALIZAR ACTIVIDAD RUTINARIA UTILIZAR LIDOCAINA EN SPRAY 2 DISPAROS CADA FOSA. 	<ul style="list-style-type: none"> OXIGENACION 100% EN MASCARILLA FACIAL 12 A 15 L TRIPTANOS (SUMATRIPTAN SC O ZOLMITRIPTAN NASAL VERAPAMILO 80 MG C/6 HRAS ATAQUES NOCTURNOS ERGOTAMINA AL ACOSTARSE 2 MG V.O