Nombre del alumno:Yereni Monserrat Pérez Nuricumbo

Nombre del profesor: Raúl de la rosa pacheco

Nombre del trabajo: Manejo de EVC Isquémico

Materia: neurologia

Grado: 6

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 30 de mayo de 2025.

enfermedad vascular cerebral (Isquémico)

10minutos

- checar signos vitales
  - frecuencia respiratoria
  - frecuencia cardiaca
  - SaTO2
  - Glucosa
  - temperatura
  - tensión-presion arterial
  - escalas
    - subtema

Escala de Cincinnati

A	Desviación de comisura labial
B	Asimetría al movimiento de brazos
C	Alteración en el habla

Escala de NIHSS

Puntaje	Interpretación
0	Sin EVC isquémico
1-4	EVC isquémico leve
5-15	EVC isquémico moderado
16-20	EVC isquémico moderado-grave
21-42	EVC isquémico grave

subtema



- diagnóstico diferencial
  - hemorragia intracraneal
  - infecciones meningeas
    - -ataque Isquémico tránsitorio
      - tumores cerebrales
      - epilepsia
        - hiponatremia
        - -hipercalemia
        - -hipoglicemia

2. 20minutos

- TAC



- subtema



3. ¿ya confirmado?

- cristerios (exclusión)
  - •NIHSS menor 4 o >25 puntos
  - •ventana de 3-4.5: DM.
  - •>80años
  - •anticongelantes.
  - •neoplasia intracraneal
  - •MAV.
  - •Aneurisma cerebral.
  - •Disección de la aorta
    - •TCE severo menor 3 m
    - •punción lumbar menor a 7 días
      - •cirugía mayor 14 días
      - •Tension arterial mayor 185/110mmHg
      - •Trauma de cráneo severo <3meses
        - •Hemorragia intracraneal aguda
        - •Glucosa <50 mg/dL
        - •Zona de hipodensidad >1/3 de la ACM



Criterios de neuroprotección / contra...

- criterios de glicemia 70-110mg
- Glucosa: -180 mg/dL->80 mg/dL
- Sodio: mayor 135 meq/L - 38 grados
- Confort: control del dolor, ansiedad y estrés
- PCO2: evitar <35 mmHg
- Hemoglobina: >7 – 9 mg/dl
- temperatura<37 C°
- evitar hiponatremia
- evitar hipercapnia
- Glicemia 120-180.
- cabeza 30g°
- = Unidad de Cuidados Intensivos Adultos

trombolizar

- Alteplasa 0.9 mg/kg
- Máximo 90 mg/kg 10% bolo x min
- infusión 90% en 60 min
- Tenecteplasa 0.25 mg/kg
- (17.5en bolo 70kg)
- Max 25mg/kg