

Marvin López Roblero

De la Rosa Pacheco Raúl

Neurología

Cuadro comparativo

6°

“B”

Cefaleas primarias	Cefalea tensional	Migraña	Cefalea en racimos
Definición	Subtipo de cefalea primaria más común.	Subtipo de cefalea severa primaria severa más común	Suele presentarse en periodos de ataques frecuentes conocidos como racimos.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Bilateral, • opresiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Unilateral, • pulsátil 	Dolor intenso de localización orbitaria unilateral constante, se puede irradiar a la frente, sien y mejilla. Frecuencia de 1 a 8 ataques por día
Síntomas asociados	Nauseas, vomito (no tiene)	Tiene náuseas y vomito	No se acompaña de aura ni de vómitos
Duración	Minutos a días	4 a 72 hrs	Duración de los ataques entre 15 y 180 min. Sin tratamiento.
intensidad	Leve a moderada	Moderada-severa	Severa
Epidemiologia	Mas frecuentes en mujeres	Mas frecuente en mujeres	Hombres
Diagnostico	Clínico por anamnesis	clínico	clinico
Tratamiento	AINES, paracetamol, ibuprofeno	<ul style="list-style-type: none"> • Zalmiptalina, • Eletriptan a dosis estándar de 40 mg • para eliminar el dolor metoclopramida 	<ul style="list-style-type: none"> • oxigeno • triptanos • octreotida • analgésicos orales