



**Nombre del alumno: Mayra Grissel Mollinedo Noyola.**

**Nombre de docente: Dra. Karla Sofía López Gutiérrez**

**Nombre del trabajo: cuadro comparativo**

**Materia: Pediatría**

PASIÓN POR EDUCAR

**Grado y grupo: 6° "B"**

**Carrera: Medicina humana.**

Comitán de Domínguez Chiapas a 08 de Marzo de 2025

# Caput vs Cefalohematoma

Las lesiones de parto más frecuente en el feto son el caput succedaneum y el cefalohematoma.

## Caput

## Cefalohematoma

	Caput	Cefalohematoma
Mecanismo	Compresión de la parte presentada sobre el cervix → Alteración del retorno venoso	Tiración mecánica de cuero cabelludo → ruptura de vasos sanguíneos del periostio
Definición	Edema de partes blandas subcutáneo con bordes mal definidos	Hemorragia subperióstica
¿Respetar suturas?	No respetar suturas	Respetar suturas.
Piel suprayacente	Con eritema o equimosis	Sin cambios.
Inicio	Durante el parto	Horas después del parto.
Resolución	24 - 48 hrs	6 - 8 - semanas.
Hallazgos	Vagamente demarcado edema con fovea cambia con la gravedad	Se distinguen márgenes inicialmente firme más fluctuante después de 48 hrs.
Complicaciones	Ninguna	Anemia hiperbilirrubinemia ictericia.