

SEXTO SEMESTRE GRUPO B

TEMA: ICTERIA NEONATAL

MATERIA: PEDIATRIA

CATEDRATICA: DRA. KARLA SOFIA

LOPEZ GUTIERREZ

ALUMNO:

PABLO ADOLFO JIMENEZ VAZQUEZ

FISIOLÓGICA	LACTANCIA MATERNA	INCOMPATIBILIDAD (Rh)	INCOMPATIBILIDAD ABO
2-3 días - Lactancia después de 20 horas, de leche por bilirrubina no conjugada	4-7 días - Lactancia por bilirrubina no conjugada	24-72 horas - Cardiorregulación - Pícdulo respiratorio - Anemia - Ictericia - Casos graves: - pletorquia - purpura - trombocitopenia - Hepatomegalia	2-7 días - Leucocitosis
4-5 días - Mayor riesgo en el hospitalizado por riesgo de infección - Mayor riesgo de ictericia (90 días) - Mayor riesgo de ictericia en neonatos por C. enterocolitica	4-7 días - Ictericia insuficiente durante los primeros días o reabsorción de los niveles de bilirrubina	24-72 horas - Síndrome de ictericia - Se observa en una mayor Rh - no sensibilizadora	2-7 días - Cuando los niveles de IgG en la sangre son altos - Los niveles de IgG en la sangre son altos - Los niveles de IgG en la sangre son altos
IX - No se requiere intervención específica - Solo ictericia	4-7 días - No se requiere intervención - Monitorización nivel de bilirrubina - Fototerapia	24-72 horas - Fototerapia - Ig IV (casos moderados graves) - Exanguinotomía - Casos graves o reabsorción	2-7 días - Fototerapia - Ig IV - Exanguinotomía - Casos graves