



Esmeralda Jiménez Jiménez

Dra. Karla Sofia Lopez Gutiérrez

Cuadro comparativo

Pediatría

Grado: 6°

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de mayo 2025

Nombre	Tiempo Días de aparición	Síntomas	Causas	Tratamiento
Fisiológica	3-4 días Prematuro 2-3 Atermino	• No está asociado a síntomas • Color amarillo brillante anaranjado • Prurito (cefalo-caudal)	• Concentración de Bilirrubina indirecta • Hiperbilirrubinemia	• Prevenir la neurotoxicidad relacionada con la bilirrubina indirecta sin ocasionar daños indebidos. • Fototerapia
Por Lactancia Materna	7 ^o día de vida Persiste: 3-10 Semanas	• El bebé se ve sano y no enfermo tiene clínicamente la ictericia	• Pacientes con ictericia por la lactancia M. • Se descarta la causa Glucuronidasa	• Monitoriza bilirrubina no requiere intervención • En caso interrumpir la lactancia 24-48h, porque hay un descenso de los cifras de bilirrubina
Incompatibilidad ABO	Primeras 24 horas	• Puede aparecer ictericia o anemia leve	• Transmisión de la madre al feto	• Fototerapia
Incompatibilidad RH	CAUSAS • Madre Rh (-) y feto Rh (+) • Los Anticuerpos maternos pueden atravesar la placenta y unirse a los glóbulos rojos del feto → Hemólisis	• Piel amarilla • Orina Oscura • Anemia • Ojos Amarillos	Días • 2^{do} hijo • Casos graves 24 horas • Mod: 48-72 horas	• Fototerapia • Exanguinotransfusión