



Diego Alejandro Flores Ruiz

Cuadri de vacunación

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Pediatría

Sexto B

PASIÓN POR EDUCAR

Vacuna	Dosis	Efectos Adversos	Contraindicaciones	Lugar donde se aplica	Edad
Antirotavirus	7.5 ml	Síntomas gastro-intestinales, fiebre, irritabilidad	Alergia al latex, antecedentes de intus- cción, malformaciones congénitas.	Vía oral	2 y 4 meses (o 2, 4 y 6 meses) Según la marca)
Neumocócica conjugada	0.5 ml	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad	Fiebre $>38.5^{\circ}$, muelas → derecho hipersensibilidad (intramuscular)		2, 4 y 12 meses
Antiinfluenza	0.5	Fiebre y malestar	Alergia al huevo, Muñola (menores 3 años) 6 y 7 meses (Guillain Barre por Brazo (mayores 3 años) dos dosis en el 1er año) + oral hasta 5 vacunas Prevac y ≥ 38		
BCG (en la tb meningea)	0.7 ml	Patología que se ulcerá y causa cicatriz (90-95%)	Sida, fx inmunopares leucemia, neoplasia o inmunodeficiencia	Brazo derecho (intradermico)	Recién nacidos (dentro de los primeros 7 días)
Hep B	0.5 ml	Fiebre, fatiga, síntomas gastro-intestinales	Fiebre $>38.5^{\circ}$ Muelas izquierdo hipersensibilidad (intramuscular)		Recién nacidos (dentro de los primeros 12-24 hrs)
Hexavalente acelular (difteria, tos, tétano, polio, hepatitis B, etc)	0.5	Enrojecimiento, dolor o edema en el lugar de aplicación	Fiebre $\leq 38.5^{\circ}$, muñola (menores 18 m) 2, 4, 6 meses + ataxia, encefalopatía refuerzo a los 18 meses	Brazo (mayores 18 m) (intramuscular)	
Triple viral SRP	0.5	Fiebre, rash, cefalea, inmunodeficiencia, parotiditis, meningitis, fiebre $>38.5^{\circ}$, enf. Purpura	Enfermedad febril (subcutánea)	Brazo izquierdo (neurologica, TB, SITX)	1 año y 6 años
DPT	0.5 ml	Fiebre y síntomas locales	Anafilaxia, encefalitis, parálisis, enf. neurologica, eritis conusífero	Brazo izquierdo (intramuscular)	4 años