



Carlos Alberto Hernández Meza

DRA. Karla Sofia López Gutiérrez

Pediatría

Grado: 6

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: B

Vacuna	Dosis	Efecto adverso	Contraindicaciones	Lugar de Aplicación	Edad de Aplicación
BcG (Evita Tb meníngea)	0.1 ml	Pápula que se ulcera y causa cicatriz (90-95%)	Sida, tx inmunosupresores Leucemia, neoplasia o inmunodeficiencia	Cara externa sup del brazo en m. deltoides	nacimiento
Hep B	0.5 ml	fiebre, fatiga. Síntomas gastrointestinales	fiebre > 38.5° hipersensibilidad	muslo I29	nacimiento
Hexavalente acelular (Dif, tét, tetan, Polio, hep B y H. Influenzae tip B)	0.5 ml	Cefalea, enrojecimiento dolor en el lugar de Punción fiebre o vómitos, eritema		tercio medio del Vasto externo	2, 4, 6 meses y 18
Antirotavirus	1.5 ml	Síntomas gastrointestinales fiebre, irritabilidad	Alergia al látex, antecedentes de Intususcepción, malformaciones Congénitas no corregidas de tracto GI	Administración Vía Oral	2, 4 meses
Neumococo conjugada	0.5 ml	Eritema, dolor, hinchazón, fiebre e irritabilidad	fiebre > 38.5° hipersensibilidad	m. deltoides o región anterior del musculo	12 meses
Anti-influenza	0.5 ml	fiebre y mialgia	Alergia al huevo, Guillain Barre por vacuna previa y fiebre > 38.5°C	En brazo o muslo	6 meses
Triple Virica SRP	0.5	fiebre, rash, Cefalea Parotiditis meningia. Rupura	Inmunodeficiencia, fiebre > 38.5°C enf. neurológica, TB S/tx, transfusión o que reciben IG esperar 3-11 meses	brazo o muslo	12 meses
DPT	0.5 ml	fiebre y Síntomas locales	Anafilaxia, eclampsia Enfermedad neurológica progresiva Crisis convulsiva	brazo o muslo	48 meses (4 años)