

ICTERICIA NEONATAL

Nombre	Fisiológica	L. materna	I. ABO	I. RH
Sintomatología	Coloración amarillenta de piel y mucosas	• Ictericia leve o moderada • Signo de deshidratación leve.	• Ictericia temprana e intensa • Anemia • Posible hepatomegalia	• Ictericia latente • Anemia severa
Causas	• Inmadurez hepática • Reducción de la bilirrubina	• Baja ingesta de leche • Deficiencia calórica por una mala técnica • Producción insuficiente de leche	• Madre grupo "O" y bebé "A" o "B" • Anticuerpos maternos atacan a los glóbulos rojos	• Madre Rh negativo y el bebé Rh positivo
Días De Aparición	• 2 al 3º día de vida • Pico en el 4º y 5º día	• 3 a 5 días de vida • Primeros días	• Primeras 24 horas de vida	• Primeras 24 hrs de vida intrauterina
Tratamiento	• Alimentación adecuada • observación • fototerapia.	• Mejor técnica de lactancia • Mayor frecuencia de tomas • fototerapia si es necesaria	• fototerapia intensiva • inmunoglobulina IV • Coanguineo transfusión en casos severos	• fototerapia • inmunoglobulina I.U • Prevención contra anti-D de la madre

ZN/S