



Nombre del alumno: Carlos Mario Pérez López

Nombre del profesor: Sofia López Gutiérrez

Nombre del trabajo: cuadro comparativo

Materia: pediatría

Grado: 6to

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: “B”

Tipo de ictericia	Causas	Sintomatología	Días de aparición	Tratamiento
Ictericia fisiológica	inmadurez hepática que baja la capacidad de bilirrubina	Picicamantía u aparecen síntomas graves	2 a 3 días y pico entre el 4to y 5to día	Alimentación adecuada fototerapia
Ictericia por lactancia	Baja ingesta calórica por insuficiente producción de leche.	ictericia leve o moderada y EECé deshidratado	Primeros 3 a 5 días de vida	Mejorar lactancia de lactancia y fototerapia Si es necesario
Incompatibilidad ABO	Madre grupo O y bebé A y B hay alto riesgo de hemólisis	Posible anemia ictericia y hepatomegalia.	Primeros 24 horas de vida	Fototerapia Intensiva inmunoglobulina IV
Incompatibilidad RH	Madre RH negativa y bebé RH +	ictericia muy intensa anemia severa e hidrops fetal	Primeros días de vida	Fototerapia Intensiva inmunoglobulina IV, exchange transfusión