

Marvin López Roblero

DR. López Gutiérrez Karla Sofia

Pediatría

Cuadro informativo

6°

“B”

Vacuna	Dosis	Efectos Adversos	Contraindicaciones	Lugar de aplicación	Edad de aplicación
BCG (Leita TG meningea)	0.1 ml	Pápula que se ulcera y causa cicatriz (90-95%)	SIDA, tx inmunosupresores, Leucemia, neoplasia o inmunodeficiencia	Carra externa sup del brazo en el musculo deltoideo	Nacimiento
Hep B	0.5 ml	Fiebre, fatiga, síntomas gastrointestinal	Fiebre >38.5, hipersensibilidad	muslo izq	Nacimiento
Hexavalente celular (dift, tetan, Polio, hep B y H. influenzae tip B)	0.5 ml	Cefalea, enrojecimiento, dolor en el lugar de punción, eritema, fiebre o vomito.		tercio medio del vusto externo	2, 4, 6 y 18 meses
Antirrotavirus	1.5 ml	Síntomas gastrointestinales, fiebre, irritabilidad	Alergia, antecedente de intosuscepción, malformaciones congénitas no corregidas	Administración via oral	2, 4 meses
Neumocócica conjugada	0.5 ml	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad	Fiebre >38.5° hipersensibilidad	musculo deltoides o región anterior del musculo	12 meses
Antiinfluenza	0.5 ml	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo, Guillain Barre por vacuna previa y fiebre >38.5°C	En brazo o muslo	6 meses
Triple vírica SRP	0.5 ml	Fiebre, rash, cefalea, parotiditis, meningea, purpura	Inmunodeficiencia, fiebre >38.5°C, enf. neurológica, TB S/tx,	brazo o muslo	12 meses
DPT	0.5 ml	Fiebre y síntomas locales	Anafilaxia, enf. neurológica, crisis convulsivos	brazo o muslo	98 meses