



Emmanuel Hernández Domínguez

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez



6-B

	Fisiológica	Lactancia materna	Incompatibilidad Rh	Incompatibilidad ABO
Aparición	2-3er días	4-7mo día	24-72 hrs	2-7 días
Clinica	<ul style="list-style-type: none"> Ictericia después de 24h de vida por ↑ bilirrubina no conjugada 	<ul style="list-style-type: none"> Ictericia por bilirrubina no conjugada 	<ul style="list-style-type: none"> Cardiomegalia Dificultad resp. Anasarca Ictericia <p>Casos graves :</p> <ul style="list-style-type: none"> Petequias Placa purpura Trombastopenia Hipoglucemias 	<ul style="list-style-type: none"> Ictericia
Causas	<ul style="list-style-type: none"> Mayor carga en el hepatocito por mayor volumen eritrocitario Menor vida media relativa de los eritrocitos fetales (90 días) Mayor reabsorción de bilirrubina en intestino por c. enterohepatica 	<ul style="list-style-type: none"> Ingesta insuficiente durante los primeros días o ↓ Relativa de los niveles de bilirrubina 	<ul style="list-style-type: none"> Sangre Rh + se infunde en una mujer Rh - no sensibilizada 	<ul style="list-style-type: none"> Cuando la madre es grupo O y producto A o B Los Ac IgG anti A o anti B atraviesan la placenta
Tx	<ul style="list-style-type: none"> No requiere intervención específica solo vigilancia 	<ul style="list-style-type: none"> No suspender lactancia Monitorizar niveles bilirrubina Fototerapia 	<ul style="list-style-type: none"> Fototerapia Ig IV (casos moderados-graves) Exanguinotransfusión (caso severo o refractorio) 	<ul style="list-style-type: none"> Fototerapia Ig IV Exanguinotransfusiones.