



**Carlos Alberto Hernández Meza**

**DRA. Karla Sofia López Gutiérrez**

**Pediatría**

**Grado: 6**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Grupo: B**

| • Tipos de Ictericia     | Causas                                                                                                                                     | Síntomas                                                                                                     | Días de aparición                                                                                      | Tratamiento                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ictericia fisiológica    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmadurez hepática</li> <li>• Reducción de la bilirrubina</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloración amarillenta de piel y mucosas</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 a 3 días de vida</li> <li>• Pico en el 4 y 5 día</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observación</li> <li>• Alimentación adecuada</li> <li>• Foto terapia</li> </ul>                     |
| Ictericia por lactancia  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• baja ingesta de leche</li> <li>• Producción</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ictericia leve a moderada</li> <li>• Deshidratación leve</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primeros 3 a 5 días de vida</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ↑ <del>la</del> lactancia</li> <li>• fototerapia si se requiere</li> </ul>                          |
| Incompatibilidad con ABO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• madre grupo "O" y bebe A o B</li> <li>• Anticuerpos maternos atacan los glóbulos rojos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ictericia temprana e intensa</li> <li>• anemia</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primeros 24 hrs de vida</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• foto terapia intensa</li> <li>• inmunoglobulina IV</li> </ul>                                       |
| Incompatibilidad RH      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• madre Rh negativo y bebe Rh positivo</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ictericia intensa</li> <li>• Anemia severa</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intrauterino o Primeros 24 hrs de vida</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• fototerapia</li> <li>• inmunoglobulina IV</li> <li>• Administrar crisis de Ant-D a madre</li> </ul> |