



Claudia Patricia Abarca Jiménez

Dra. Karla Sofia López Gutierrez

Vacunación

Pediatría

6°

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 8 de abril del 202

VACUNACION

Vacuna	Dosis	Via de admin.	Edad	Contraindicación	Efecto adverso
BCG Levita Tb meningea).	0.1 ml	Intradermica	Nacimiento	1) GIDA. 2) Tx inmunosupresor 3) Leucemia 4) Neoplasias 5) Inmunodeficiencia	Ropula que se ulcera y causa Cicatriz (90-95)%.
Hepatitis B	0.5 ml.	Intramuscular	- Nacimiento - A partir de <u>11</u> años sin antecedente.	1) Fiebre > 38.5° 2) Hipersensibilidad.	- Fiebre - Fatiga - Síntomas gastrointestinal
Hexavalente acellular Cdift, t oste, tetan, polio, hepB influenza B).	0.5 ml.	Intramuscular	2 meses 4 meses 18 meses	1) Hipersensibilidad 2) Inmunosupresor 3) GIDA 4) Problema respiratorio.	- Dolor - Fiebre - Irritabilidad - Otros síntomas
Antirrotavirus	1.5 ml	Oral.	2 meses (1) 4 meses (2)	• Alergia al latex • Intususcepción • Malformación de tracto GI	• Síntomas gastrointestinal • Fiebre • Irritabilidad
Neumococo conjugada	0.5 ml	Intramuscular	60 años en adelante	1) Fiebre > 38.5° 2) Hipersensibilidad	• Eritema • Dolor • Induración • Fiebre • Irritabilidad
Antiinfluenza	0.5 ml	Intramuscular	10-59 años con fx riesgo - Embarazadas > 60 años.	1) Alergia al huevo 2) Guillain barre por vacuna previa y 3) Fiebre > 38.5°	• Fiebre • Mialgia