



Oscar Eduardo Guillén Sánchez

Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Pediatría

Cuadro comparativo

6-B

NOMBRE	DOSIS	VIA	EDAD	EFEKTOS ADVERSOS	CONTRAINDICACIONES
BCG	0.1 ML	INTRADERMICA	NACIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • ERITEMA • INDURACION • DOLOR • CICATRIZACION DURANTE 3 MESES. (PAPULA, MACULA Y NODULO) • FIEBRE 	<ul style="list-style-type: none"> • EMBARAZO • LEUCEMIA • LINFOMAS • NEOPLASIAS MALIGNAS • INMUNODEFICIENCIAS • VIH
ANTI HEPATITIS B (10 MCG)	0.5 ML	INTRAMUSCULAR	NACIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • DOLOR • ERITEMA • INFLAMACION • INDURACION • FIEBRE 	<ul style="list-style-type: none"> • REACCION ALERGICA • ENFERMEDADES CON FIEBRE
HEXAVALENTE ACELULAR	0.5 ML	INTRAMUSCULAR	2,4,6, 18 MESES	<ul style="list-style-type: none"> • DOLOR • INDURACION • ERITEMA • CALOR DEL SITIO DE PUNCION • FIEBRE 	<ul style="list-style-type: none"> • REACCION ALERGICA • ENCEFALOPATIAS • DESORDEN NEUROLOGICO PROGRESIVO

ANTI-ROTAVIRUS	1.5 ML	ORAL	2,4	<ul style="list-style-type: none"> • DIARREA • IRRITABILIDAD • VOMITOS • FIEBRE • SOMNOLIENCIA • RINORREA 	<ul style="list-style-type: none"> • REACCION ALERGICA • PERSONAS DE 8 MESES DE EDAD Y MAYORES • INMUNODEFICIENCIA COMBINADA SEVERA • INVAGINACION INTESTINAL
ANTI-INFLUENZA	0.5 ML	INTRAMUSCULAR	6,7 MESES EN TEMPORADA INVERNAL. POSTERIOR ANUAL HASTA LOS 59 MESES (5 AÑOS)	<ul style="list-style-type: none"> • DOLOR • ERITEMA • SENSIBILIDAD • INFLAMACION • APARICION DE NODULO • FIEBRE 	<ul style="list-style-type: none"> • LACTANTES MENORES DE 6 MESES • REACCION ALERGICA
ANTI-NEUMOCOCICA CONJUGADA	0.5 ML	INTRAMUSCULAR	2,4,12 MESES	<ul style="list-style-type: none"> • ERITEMA • INFLAMACION • INDURACION • DOLOR • FIEBRE • 	<ul style="list-style-type: none"> • REACCION ALERGIA • PADECIMIENTO CON FIEBRE • INMUNODEPRIMIDOS • LACTANTES CON PREMATUREZ

TRIPLE VIRAL (SRP)	0.5 ML	SUBCUTANEA	12, 18, MESES Y 6 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> • DOLOR • INDURACION • ERITEMA • CALOR EN SITIO DE APLICACIÓN • FIEBRE 	<ul style="list-style-type: none"> • PADECIMIENTOS CON PATOLOGIAS QUE PROVOQUE FIEBRE • APLICACIÓN DE 11 MESES QUE CONTENGAN ANTICUERPOS DERIVADOS DE SANGRE • TRO
TIPLE BACTERIANA (DPT)	0.5 ML	INTRAMUSCULAR	48 MESES (4 AÑOS)	<ul style="list-style-type: none"> • ERITEMA • EDEMA • DOLOR FIEBRE • LLANTO CONSTANTE EN LACTANTES 	<ul style="list-style-type: none"> • NO APLICAR A MAYORES DE 6 AÑOS CON 11 MESES Y 29 DIAS DE EDAD • REACCION ALERGICA • ENCEFALOPATIA • DESORDEN NEUROLOGICO
COVID-19	0.5 ML	INTRAMUSCULAR	5 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> • DOLOR • HIPEREMIA • ERITEMA • INDURACION • EDEMA • FIEBRE 	<ul style="list-style-type: none"> • ALERGIA AL COMPUESTO

ANTI-VARICELA	0.5 ML	SUBCUTANEA		<ul style="list-style-type: none">• ERITEMA• DOLOR• EDEMA FIEBRE	<ul style="list-style-type: none">• ENFERMEDADES AGUDAS O MODERADAS• APLICACIÓN EN LOS ULTIMOS MESES QUE CONTENGAN ATICUERPOS• ANTECEDENTES DE TROMBOCITOPENIA• VACUNACION CONTRA SARAMPION
----------------------	--------	------------	--	--	--

Bibliografía

SALUD, S. D. (2025). PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL . *SECRETARIA DE SALUD* .