

Nombre	Causa	Día de aparición	Sintomatología	Tratamiento
Ictericia fisiológica	• Fisiológica • TORCH • Anemias hemolíticas • Prematuro	- 2 - 3 días	- Ictericia Primeras 24 hrs - Bilirrubina sérica > 12 mg/dl - Ictericia Persista 10-14 días	- Fototerapia 4-6 horas - Bilirrubina suspendido al menos 2.94 mg/dl
Ictericia LM exclusiva	• Sepsis • TORCH • Obstrucción intestinal • LM	- 4 - 7 días	- Bilirrubina elevada 3-12 mg/dl	• Fototerapia → respuesta máxima 12-6 horas • Decremento 6-20% BT • Suspender 13-14 mg/dl • Exanguinotransfusión
Incompatibilidad ABO	• Madre o RM: A, B, AB	• Primeras 24 horas	• Pálidez • Anasarca • Aumento del líquido-bazo • Ictericia Primeras 24 hrs • No hídrops	• Fototerapia 2-6 horas
Incompatibilidad RH	• Embarazada RH - no sensibilizada • Padre RH + o desconocido	• Primeras 24 horas	• Anemia fetal grave • Hiperbilirrubinemia severa • Hídrops	• Fototerapia 2-6 horas • Exanguinotransfusión • Vacuna anti-D 100mcg 28-32 SDG