



**Adriana Itzel Gallegos Gómez**

**Karla Sofia López Gutiérrez**

**Lesiones primarias**

**Pediatría**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**6to semestre**

**“B”.**

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de abril de 2025.

# VACUNACION

VACUNA	DOSIS	EFFECTOS ADVERSOS	CONTRAINDICACIONES	VIA DE ADMINISTRACION	EDAD
BCG (Evita Tb meningo).	0.1 ml	Popula que se ulcerá y causa cicatriz (90-95%).	SIDA, tx inmunosupresor, leucemia, neoplasias o inmunodeficiencia	Intadermica, región deltoidea del brazo derecho.	Nacimiento
Hep B	0.5 ml	Fiebre, fatiga, síntomas gastrointestinales.	Fiebre >38.5°, hipersensibilidad.	1/3 medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo, intramuscular.	1eras 24 hrs de vida en RN $\geq 1/2$ 2000 grs
Hexavalente acelular (dift, tosfc, tetan, polio, hep B y H. influenzae tipo B).	0.5 ml	Dolor en el sitio, fiebre, vómitos, diarrea, cefalea, edema en la zona.	Encefalopatia, hipersensibilidad, reacción anafiláctica	Intramuscular, en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho $\leq 18$ meses, región deltoidea del brazo izq $> 18$ meses.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 meses</li> <li>4 meses</li> <li>6 meses</li> <li>Refuerzo <math>\rightarrow</math> 18 mes</li> </ul>
Antirotavirus	1.5 ml	Fiebre y miadgia.	Alergia al huevo, Guillain barre por vacuna previa y fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$ , no aplicar después de 7 mes con 29 días de edad	Via oral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 meses</li> <li>4 meses</li> </ul>
Neumococica conjugada	0.5 ml	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad	Fiebre $> 38.5^{\circ}$ , hipersensibilidad	Via intramuscular en el 1/3 medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 meses</li> <li>4 meses</li> <li>12 meses</li> </ul>
Antiinfluenza	0.5 ml	Fiebre y miadgia	Alergia al huevo, Guillain barre por vacuna previa y fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$	Via intramuscular, en el 1/3 medio de la cara anterolateral externa del muslo izq $\leq 18$ meses, región deltoidea del brazo izq $> 18$ meses	<ul style="list-style-type: none"> <li>6-59 meses 2 dosis, intervalo de 4 semanas.</li> <li>5-9 años</li> </ul>
Triple viral SRP	0.5 ml	Fiebre, rash, cefalea, parotiditis, meningitis, purpura.	Inmunodeficiencia, fiebre $> 38.3^{\circ}\text{C}$ , enf neurologicas, TB si se transfusión o que reci ben IG esperar 3-11 meses	Via subcutánea en la región deltoidea del brazo izquierdo	<p>1era dosis: al cumplir 12 meses</p> <p>2da dosis: 18 meses</p>
DPT	0.5 ml	Fiebre y síntomas locales	Anafilaxia, encefalopatia, enf neurologica progresiva, crisis convulsivas	Via intramuscular en la región deltoidea o tricipital del brazo izquierdo	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 años</li> </ul>

## **Bibliografía**

PVU. (2025). Vacunación en edad pediatrica. En S. d. salud. México: Programa de vacunación universal.